

外臺秘要


[H]

Chinese

Vol III

3

v.5-v.7



尚德按
壯
疑當作北

唐王燾先生外臺祕要方卷五目錄癰病十門

療癰方二十一首

溫癰方五首

十二時癰方一十二首

瘡癰方五首

久癰方八首

壯癰方二首

灸癰法一十三首

許仁則療癰方四首

五藏及胃癰方六首

山瘰癧方一十九首

發作無時癰方三首

間日癰方二首

勞癰方三首

一切癰方四首

瘰癧法六首

唐王壽先生外臺祕要方卷五

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

男坤晉錫錫為為載載父全校

療瘧方二十一首

通按二十
五日一作
二十六日
二作二十
一作二十
高德樓盤
病源作盤

病源夏曰傷暑秋必病瘧瘧病之發以時者此由邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作稍益晏者也其出於風府日下一節二十五日下至尾骶二十六日入於脊內注於伏膂之脈其氣上行九日出於缺盤之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府則腠理乃發發則邪氣入邪氣入則病作今衛氣日下一節則其氣之發也不當風府其日作者奈何曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也風之與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧得以時休者何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沈沈以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升而不升為邪所中陽遇邪則蹙陰遇邪則緊蹙則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃汗出旦中旦發晚中晚發夫瘧其人形瘦皮必粟起問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解出第十卷中

廣濟療瘧常山散方 常山銍升麻仁蜀漆分 右三味搗篩為散一服二錢匕和井華水煮米半合頓

服少間則吐吐訖則差忌生葱生菜及諸菓子生冷油膩等物

忘生葱生菜
文丘仲備急同並出第一卷中

瘰癧若但熱不寒者邪氣在心藏外舍分肉之間令人汗爛肌腐

又辨癰歲發至三歲發連日發不解者以骨下有痞也療之不得攻其痞但虛其津液先其時發汗其

良易已先小寒者漸引衣自覆汗出小便利則愈瘧者病人形瘦皮上必粟起尚德按此千金之文仲景無此論

月十五日愈及不差者當自盡得也如期不差當云可師曰此結為癰瘕名曰

又陷癰瘡以月一日發當以十五日愈言不差者中人豆魚也女界不差者中人魚也

瘡母宜急療之大鼈甲煎方
鼈甲分炙烏扇分黃芩柴胡分鼠婦乾薑分大黃芒硝分桂枝

三
等慈二分
石韋二分
厚朴三分
牡丹皮五分
瞿麥二分
紫葳三分
半夏一分
人參一分
廣蟲五分
阿膠三分
蜂窠

分人素
一分八分
二分六分
三分去
石二十三
末末之又
菱竈下土一斗青西一斛五升浸土

赤消分 蛇蛭 有仁皮共熬 右二十三味末之取銅鑊一十二斤注一觔

酒盡一半著蟹甲於中煑令泛爛如膠漆絞取汁下諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服忌葷

千金有海藻大戰蟲無

養生要法
一、飲食宜節
二、起居宜適
三、情志宜平
四、勞逸宜均
五、陰陽宜調
六、寒暑宜避
七、蟲蛇宜防
八、瘴氣宜除
九、疫癘宜戒
十、刀傷宜慎

又癰發渴者與小柴胡去半夏加栝蘆湯方
柴胡兩黃芩兩人參兩大棗枚枳實七錢炙
一聖心錄上

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三忌海藻菘菜勞瘡並出

第十五

卷中

肘後療諸瘡方
取青蒿一把
右一味以水一升漬絞取汁盡服之文仲同

右一味島末酒服方寸匕至發時令服三服兼用火炙無不斷者忌葷菜

文仲備急錄

又方 牛膝莖葉一把 以酒三升 漬一宿 分三服 令微有汗 氣不即覺 更作 不立 三月 驗同 並出

深師療癰膈痰不得吐宜吐之常山烏梅湯方 烏梅_{半斤}桂心_{半斤}芫花_{半斤}豉_{半斤}半夏_{半斤}常山_{半斤} 右六

味切以酒三升水四升合煮取二升分三服必得吐一方取三升忘生葱羊肉餵生菜_{一方無半}

又療癰丸神方 人參_{三兩}鉉丹_{三兩}天雄_{三兩} 右三味搗合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服二丸中

當溫熱四肢淫淫痺為知服藥忌飽飯食癰斷後食如常萬不失一_{備急文}

又療癰擦膈湯方 常山_{三兩}甘草_{三兩}松蘿_{二兩}烏梅_{十四枚}黃芩_{二兩}瓜蒂_{十四枚} 梔子仁_{十四枚} 右七味切以

酒二升漬一宿明旦以水四升煮取三升分三服忌海藻生蔥生菜菰菜等

又癰結實積熱煩擾迷胃寒熱但多綿愒困篤常山大黃湯方 常山_{三兩}甘草_{三兩}前胡_{二兩}大黃_{三兩} 右

四味切以水一斗煮取三升半下大黃煮取三升分澄令冷初服七合中服八合比欲發服九合王

州大子因癰危困服此皆愈忘海藻菰菜生蔥生菜等

又癰癰醇醕湯方 生薑_{三兩}烏梅_{三兩}桂心_{二兩}常山_{三兩}蘘荷根_{三兩} 右六味切以水六

升煮取一升曰醇未發時須頓服更以水三升煮取一升曰醕至發不斷復頓服甚良別方說發日平

旦服醕一升以醇著頭邊若欲發便服醇神良二說不同也忘海藻菰菜生蔥生菜_{此第二十}

千金麻黃湯療癰須發汗方 麻黃_{四兩}大黃_{四兩}括蕒_{四兩}甘草_{一兩} 右四味切以水七升煮取二升半

分三服未發前食項服臨發更服服後皆覆取汗忌海藻菰菜_{此卷中}

千金翼療癰病醫不能救者方 以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量得繩置項上

著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定比至過發一炊久候

之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足_{此第十}

崔氏療癰會稽頓公常山湯方 常山_{三兩}石膏_{八兩}碎 甘竹葉_{一把}糯米_{一百粒} 右四味切以水八升明

旦欲服今晚漬於銅器中露置星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於銅器裏緩火煎

取三升分三服日飲出一服臨發又一服若即定不須後服取藥滓石膏裏置心上餘四分置左右手

足心甚驗忘生蔥生菜出第四卷中

備急常山華院桂心丸神良方 甘草炙常山 大黃 桂心各四分 右四味末之蜜和乎旦服如兔屎

每欲發服六九飲下之欲服藥時先進少熱粥良忌海藻菰菜生蔥生菜穀仲同出

延年療瘧常山丸方裴石 常山細青木香四分蜀漆一分牡蠣二分大黃一分烏梅肉一分丹砂二分政分

無知母二分鼈甲一分麻黃一分右十一味搗篩蜜和為丸如梧子未發前粥飲服五丸訖微吐後須

吏任食至欲發更服十九忌菰菜生血物生蔥生菜油膩崔氏

又療瘧九方 常山三甘草二分知母四分右三味搗篩蜜和為丸如梧子未發前飲服十五丸臨發

服十五丸得快吐則愈忌海藻生菜菰菜並出中

必効療瘧雞子常山丸方 取雞子一枚斷開頭出黃及白令盡置小鑊子中又取常山細末量滿前空

殼又傾鑊子中又量白蜜還令滿殼復傾鑊子中三味同攪微火煎之勿停手微冷可丸則停丸如梧

子如病人午時發已時服三十九欲至發時又服三十九用飲汁下欲吐任吐亦如前服訖更不發者

不須服服後禁脂膩油麪生菜瓜果七日此方初賜魯將軍服之立效小品崔氏文仲延年史家備急並同

又療瘧不差虎骨常山丸方 虎頭骨炙常山 甘草炙鼈甲炙烏梅 薑蕤 白薇 升麻 茯苓

石膏研知母 麥門冬心去豆豉煮地骨白皮 右十四味各等分合搗蜜和丸如梧子大未發前日晚

空肚服二十九至發日平旦服四十九如人行十里食白粥一椀欲發時亦服三十九三日內慎生冷

萬無一觸不吐自差魏右史處得云奇效忌海藻菰菜大酢生蔥生菜菰菜

又療瘧常山酒方 常山切獨頭蒜一頭去根糯米一百粒烏豆一百粒清酒一升右五味病未發前一日

以酒浸藥於甕中以白紙一張覆之甕上橫一刀欲發時三分飲一分如未吐更服一分得吐則差忌

生菜生葱並出第一卷中

兩德按並
出字下疑脫

通接升麻
又一作烏
扇

古今錄驗療瘧鼓心丸方

香鼓五合常山二大黃三附子二分

右四味搗篩蜜和丸服如大豆十

丸當勿食比至發來令服三十丸瘧不止亦可至四十丸瘧必止若膈上有停痰欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨常有驗忘生蔥生菜等楊孔惠方出

又烏梅丸療瘧無間溫瘴瘧瘧悉皆主之方

烏梅肉二常山二鼈甲二香鼓二蜀漆二用人參二肉

蓯蓉二桂心二知母二桃仁二別搗如稀餿

右十味搗篩為末蜜和丸如桐子空心以酒飲任下三十

丸忘生蔥生菜蓯蓉菜海藻菰菜各一方有升麻甘草

五臟及胃瘧方六首

病源肺病為瘧者乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲清雄忽爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察病觀疾表裏相應依源審療乃不失也

心病為瘧者令人心煩其欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而忽卒反於常倫或言未訖便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可療者明而察之肝病為瘧者令入色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲患忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未訖以手向眼如有所思若不即病禍必至矣此肝病聲之候也其人若虛則為寒風所傷若實則熱氣所損陽則瀉之陰則補之

脾病為瘧者令人寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已則汗出若其人本來少於喜怒而忽反常嗔喜無度多言自笑不答於人此是脾病聲之候也不盈旬日禍必至矣

腎病為瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀身掉不定暗問然手足寒若人本來不喜不怒忽然審而好瞋怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手介柵腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜以察之遂以療之

夫瘧脈者自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已若脈數而緊者可發汗針灸之脈浮大者不可針灸之凡瘧先發食頃乃可以療之過之則失時

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱燭燭燭燭喝喝然熱止汗出難已刺却中出血

足少陽之瘧令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

足陽明之瘧令人先寒洒洒漸寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月火光火氣乃快然刺足陽明膈上

足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則嘔嘔已乃哀則取之

足少陰之瘧令人悶吐嘔甚多寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數小便意恐懼氣不足腹中悵悵刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚發熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

尚德按千金養一

尚德按千金養一

腎瘧者令人洒洒腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧者令人且病也善飢而不能食食即支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血並出第十卷中

千金瘧肝邪熱為瘧顏色蒼蒼戰掉氣喘或熱久勞動如瘧積年不差烏梅丸方烏梅肉四分蜀漆四石

膏八分鼈甲四分常山六分香鼓一合知母四分甘草三分細辛三分苦參四分姜蕤五分右十一味搗篩蜜和

如梧子大酒服十九日再飲下亦得忘菜生菜葱海藻菰菜

又瘧心瘧令人煩心甚欲得清水多寒少熱者常山湯方常山兩淡竹葉切二梔子仁枚三石膏五兩

東烏梅枚三鼈甲枚四甘草兩一香鼓一外蜀漆兩三右九味以水九升煮取三升分溫三服忌生葱

生菜菰菜人莧海藻同紫

尚德按千
金林米三
百一十粒

又療脾熱或渴或不渴熱氣內傷不洩轉為脾瘧令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴轉汗出常山丸方

常山三兩甘草半兩知母兩薑甲炙兩 右四味搗篩蜜和丸如梧子大未發前酒服十丸臨服又服

正發又服一服忌生蔥生菜海藻菰菜人苋等

又療肺熱痰聚胸中來去不定轉為瘧其狀令人心寒甚即發熱熱間善驚如有所見常山湯方 常山

兩三林米三百粒甘草二分 右三味切以水七升煮取三升分三服至發時令三服盡忌生蔥生菜海藻

菰菜等同藥

又療腎熱發為瘧令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒常山湯方 常山三兩烏梅三枚香

豉八合淡竹葉切一葱白一握除青令盡 右五味切以水九升煮取三升去滓分溫三服至發令盡忌生蔥

生菜等並出第十卷中

刪繁療胃脘瘧者令人善飢而不能食四肢脹滿氣喘鬱蘆丸方 藜蘆一兩皂莢一兩去皮常山一兩巴豆三

皮去牛膝一兩 右五味熬蘆皂莢色令黃合搗為末蜜丸如小豆旦服一丸未發前一丸正發一丸

一日勿食飲忌野猪肉蘆笋生蔥生菜狸肉等附於後千金同出第六卷中

溫瘧方五首

病源夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因

遇大暑腦髓錄肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於

外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧

先寒而後熱者此由夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒淒之小寒寒迫之藏於腠理皮膚中秋

傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒

瘧先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見熱者溫瘧也第十卷中

甲乙經黃帝曰夫瘧皆生於風夏傷於暑秋為瘧瘧

外臺必要 卷五 溫瘧方五首

尚德按先
絕千金同
注誤
尚德按甲
乙經病作
之陽字

尚德按六
合要略作
二合
人按仲景
無用耗梗
米云云語

黃帝問瘧先寒而後熱何也岐伯對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也名曰寒瘧

又問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也名曰溫瘧

其但熱而不寒者陰氣先_{附金}絕陽氣獨發即少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧

又曰溫瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春即陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓鑠肌

肉消釋腠理發洩因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是者陰虛而

陽盛威則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則復寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

又曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒金於皮膚之內

分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱不寒熱氣內藏於心外舍分

肉之間令人銷鑠脫肉故名曰瘧瘧_{出庚基第}

廣濟療溫瘧漸漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方常山_{三雨}車前葉_{二雨}甘草_{二雨}獼猴骨_{三雨}烏梅肉_{二雨}天靈

蓋_{一作兩燒}末_燒薑汁_三右七味切以水六升煮五味取三升去滓下糞汁天靈蓋末分三服微吐不利

忌生蔥生菜海藻菰菜麴粘食等

又療溫瘧常山丸方常山烏梅肉_煮豉天靈蓋_{燒分}知母硃砂蜀漆大黃_{各四}右

八味搗篩蜜和丸如梧子空肚以溫酒下二十九至三十九日三服並未發前服不吐利忌生蔥生菜

生血等物_{並出第}

千金論曰瘧瘧者陰氣孤絕陽氣獨發其候也少氣煩滿手足熱欲嘔熱而不寒氣藏在心

又曰有溫瘧者其脉如平人無寒時熱其候骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解皆白虎加桂心湯主之

方知母_{二雨}甘草_{二雨}石膏_{一斤}梗米_{六合}右四味切以水一斗二升煮取米爛去滓加桂心_{三雨}煎取三

升分溫三服覆令汗先寒後熱汗出者愈忌海藻菰菜生蔥傷寒論云用耗梗米不熟稻米是也_{出第}

備急竹葉常山湯療溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如覺微寒或瘧瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足煩熱乾嘔者瘧瘧先大寒後大熱者並主之神效尤宜乳下小兒亦差方 常山三兩切 淡竹葉握

小麥升 右三味以水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服忌生菜葱同小品文仲並 延年療溫瘧壯熱不能食知母鼈甲湯方 知母 鼈甲吳地骨皮各三兩 常山二兩切 竹葉切 石膏四兩

右六味切以水七升煮取二升五合去滓三服忌蒜猪肉苽菜生葱生菜出第十卷中 山瘧瘧方一十九首

病源此病生於嶺南帶山瘧之氣也其狀發寒熱休作有時皆由挾溪源嶺瘧溫毒氣故也其病重於傷暑之瘧矣出第十卷中

小品療山瘧瘧陵鯉甲湯南方山嶺溪源瘧氣毒作寒熱發作無時瘧黃腫滿四肢痺弱皆山毒所為也並主之方 陵鯉甲十片又千金用十四片 烏賊魚骨去鼈甲一吳各常山三兩 附子一枚 右五味切以酒三升漬之一

夕先瘧發前稍稍服之勿絕藥味兼以塗身體斷雜人勿食飲過時乃得通人進飲食忌苽菜生葱生菜豬肉并金文仲備急經心 菜豬肉并金文仲備急經心

千金療下寒下熱有下無山瘧瘧酒方 常山三兩 鼈甲吳升麻 附子 烏賊魚骨去甲各 右五味並切絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌豬肉生葱生菜苽菜

切絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌豬肉生葱生菜苽菜附後錄老瘧久不

備急夫瘧與瘧分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率稱為瘧江北總號為瘧此由方言不同非是別有異病然南方溫毒此病尤甚原其所歸大略有四一山溪毒氣二風溫疫飲三加之鬼癘

四發以熱毒在此之中熱毒最重故所用藥物須審病源患瘧瘧之後特須防瘧而發痢死不旋踵所以然者瘧體先虛虛不宜痢人瘧宜冷差痢宜溫斷痢則益瘧斷瘧則益痢大率如此不可不慎非直藥

瘧亦須宜加將息取適若能一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘧最其妙也如不然先須斷痢然後瘧瘧瘧瘧緩痢急故也仍率須作挾毒防之不得專醫其痢又服瘧藥皆在發前必須平旦空腹服藥之時後勿洗手面漱口勿通外人勿與食勿勞力既過發時久小進糜粥如此將瘧無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難瘧得瘧之後復成癥癖亦有即發氣者死不救若熱渴者鼓汁煖服取足得吐彌善水煮鼓所屏汁與服兼時進生薑根汁其大熱盛者與紫雪如雨裏許大水和飲之并燒猪糞人糞作黃龍湯亦善各可服三二升又搗一大鼠絞汁與服大止熱毒瘧熱病服此俱效其氣并頭皮五臟等全持若汁少者少許水和服亦不難服常用立驗也

又瘧瘧瘧服藥後灸法 灸大椎三四十壯無不斷若先寒者將欲寒預前以炭火安牀下令背煖并灸

臑甲末一方寸匕煖酒和服至發時令得三服被覆過時無不斷此是陶氏法比欲寒時但以火炙其

背亦乃即差者縱發亦輕效驗

又瘧瘧瘧常山丸方 常山 黃連 鼓子三附子二兩 右四味搗篩為末蜜和丸如梧子發前空腹

服四九欲發更服三九飲下之自旦至暮乃食三日勿雜食豬肉魚肥膩及生冷生蔥生菜桂州家傳已用有

設此方藥病者差 又麻黃散方 麻黃去節 常山 杏仁去皮尖 人參 乾漆去根 甘草炙 臑甲各二兩 右七味作散平旦空腹溫

酒三合服方寸匕日再宜七日連服服後七日不得食雜物此許仁則五方元比部云在嶺南服得力

大驗年時常服一劑按此兼補虛羸者忌蔥菜生蔥生菜海藻菰菜

又若患瘧熱實兼吐痢者大黃湯方 大黃 常山 升麻 甘草炙各三兩 右四味切以水七升煮取二

升半分三服發前盡服別取吐利此蔣家傳忌海藻菰菜生蔥生菜

又若瘧熱兼痢苦渴者烏梅飲方 烏梅二十枚 右一味以水一大升煮取一大盞去梅和一匙蜜

通按指當
作愈
尚德按指
是病損之
義古方書
每用之

延年蜀漆丸主嶺南瘴氣發作熱作寒積勞似瘧皆主之千金翼方云兼主瘡癰連年不差方蜀漆

知母升麻白薇地骨皮麥門冬各五兩烏梅肉鼈甲炙姜莖各四石膏分甘草三分常山分

豆豉一合右十三味搗篩為末蜜和丸如梧子大飲下十九丸日再服加至二十九丸此方用無不差加

光明砂一兩神良忌海藻菰菜人莧生蔥生菜千金翼方卷十七救急瘡癰瘻經百日或一年以上諸藥不能差進此方無不損者蜀漆湯方白薇蜀漆知母

甘草炙苦參升麻龍膽各二兩常山大黃別切後下鼈甲炙石膏碎茯苓黃芩香豉各二合

獨蒜切淡竹葉升切右十六味切以水一斗清之并春酒二升合煮取三升去滓分三服未發前

一服欲至發時又一服皆溫之當發日勿見人在一靜房臥藥滓置病兒頭邊仍以藥汁塗手面過時

任出忌肥膩腥滑物生冷海藥人菰大酢菰菜生蔥生菜

又硃砂丸方硃砂洗明牛膝常山右三味搗篩為末蜜和丸如梧桐子候瘧發日平明服七

丸飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差忌生蔥生菜生血物油膩牛肉等

又勅賜長孫祥極效常山湯方常山分橘皮分牡蠣分桂心分右四味搗篩為散發日平旦酒服

一方寸匕臨發又一匕發後又一匕二日不得洗手面七日忌食雜物唯藥用酒餘皆斷或吐或不吐

皆差忌生蔥生菜

又方取五六歲兒小便一升內白蜜二大匙攪使相得去白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不

得吐但數小便亦佳以前兩方吐碧痰外更吐白沫出後可喫食不飲瘴氣終不除

又常山湯方常山苗一握無名草獨蒜洗淡竹葉洗鼈甲炙合鼈甲右五味切以苦酒三升煎

取一升臨發隨性多少服之盡服之訖當大吐便愈忌人莧生蔥生菜

古今錄驗瘴癘及嶂氣常山湯方常山細切右一味搗碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒一小

升半漬一宿旦去滓煖服盡須更當吐令盡好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生蔥生菜

山瘴癘方十九首

生冷肉燒油膩若早發者半夜服要令吐出第四卷中

近效瘧瘴孟補闕嶺南將來極效常山丸方 常山 豉 桃仁 蘇合 右三味各搗末先以豉和

桃仁搗如泥然後下常山末細攪蜜丸如梧桐子候欲發前一食時酒下四十九須臾更服二十九如

不差更服遠不過三服能信用者無不差忌生葱生菜

又凡跋涉江山防諸瘴癘及蠱毒等常服木香犀角丸方 青木香 犀角 羚羊角 滑石 升麻 玄參

豬苓 檳榔 各十兩 炙甘草 八兩 分 右十味搗篩為末蜜和丸如梧子酒飲服三十九日二

服若體熱即去甘草檳榔加大黃二十分忌海藻菴菜

又主瘧兼痢無問赤白水穀鮮血瘧皆差黃連犀角丸方 黃連 犀角 犀角 香豉 龍骨 牡蠣 各二分

右五味搗篩為末蜜和丸如梧子米飯下三十九日三服差止忌豬肉冷水油膩等

又瘧瘧不差蜀漆丸方 蜀漆 青木香 升麻 鼈甲 炙牡蠣 硃砂 豬苓 香豉 各四兩 常山 大

黃鎔八 右十味搗篩為末蜜和為丸如梧子米湯下十二九日二服漸漸差至平復止忌人葷油膩

陳臭生血等物

十二時瘧方一十二首

千金翼黃帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯答曰瘧有十二種帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯曰但得

瘧鬼字便愈不得其字百方不愈黃帝曰瘧鬼者十二時願聞之岐伯曰

寅時發者獄死鬼所為瘧之 右以瘧人著蜜上灰火一周莫令火即差

卯時發者鞭死鬼所為瘧之 右用五色衣燒作灰三指撮著酒中無酒用清水服之

辰時發者墮木死鬼所為瘧之 右令瘧人上木高危處以棘子塞木根間立差

巳時發者燒死鬼所為瘧之 右令瘧人坐師以周匝然大差

午時發者餓死鬼所為瘧之 右令瘧人持脂入於田中無人處燒脂香假拾薪去即差

尚德按答
千金翼作
對下兩岐
伯下皆有
對字
又按大字
下千金翼
有減字

未時發者弱死鬼所為療之 右令瘡人臨發時三渡東流水即差

申時發者自刺死鬼所為療之 右令瘡人欲發時以刀刺塚上使得姓名字呪曰若差我與汝拔却

即差

酉時發者奴婢死鬼所為療之 右令瘡人確梢上擗上卧莫令人道姓字即差

戌時發者自絞死鬼所為療之 右令索繩繫其手脚腰頭即差

亥時發者盜死鬼所為療之 右以刀子一口箭一枝灰一周刀安瘡人腹上其箭橫著底下差

子時發者寡婦死鬼所為療之 右令瘡人脱衣束廟床上卧左手持刀右手持杖打令聲不絕瓦盤

盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所為療之 右令瘡人當戶前卧頭東向血流頭下即差

並出第十卷中

發作無時瘡方二首

病源夫衛氣者陽氣也一日一夜大會於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作當其時陰陽

相并隨其所勝則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以休作無時也

出第十卷中

肘後瘡瘡發作無常心下煩熱者常山湯方 常山

二甘草半兩豉五合

右三味切以水六升煎去滓

取二升再服當快吐仍節飲食忌海藻菘菜生葱生菜

文仲

又雞子常山丸療諸瘡並經服諸藥法術不斷發無復定時不可復斷者宜服此丸忌食物勿勞力即斷

方 常山

三兩

右一味搗篩為散以雞子白和併手為丸如梧桐子大令圓調丸訖分置銅錕子中以湯

煮銅錕令熱殺得雞子腥氣即止以竹葉清飲服三十丸欲吐但吐比至發時令得三服時早可食者

斷若晚不可斷食者當作竹葉汁糜食之忌生葱生菜

理心錄同並出第一卷中

瘡瘡方五首

病源夫瘡瘡者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗然其畜作有時以瘡之始發

尚德按或
病源作疑
下同

尚德按營
病源作榮

先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則外內皆熱頭痛而渴唯欲冷飲何氣使然此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽明虛陽明虛則寒慄鼓頷太陽虛則腰背頭痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗出空疏腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及得以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作其間日作者謂其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作

卷第十

小品常山湯療瘧瘧先寒戰動地寒解壯熱日日發及間日發並斷方

鼈甲一兩 汶竹葉切三升 常山雨

甘草

酸三久酒升

右五味切以酒清藥力置上覆頭安露地明旦以水七升煮取三升分五服比未

發前令盡當吐吐極傷多不必盡劑但斷人禁飲食得吐過時乃佳忘人薏苡藻菰菜生葱生菜

出第六卷

中

集驗夫瘧必從四肢始療方 先其時一食頃用細左索繩緊束其手足十指過發時乃解之

附金

又方 先作羊肉臠餅飽食之其進少酒隨所能令其欣欣有酒氣入一密室裏然炭火厚覆取大汗則

差燕國公說此方常見用有驗

並出第二卷中方士弱曰虛者得效實者彌甚

又療溫瘧勞瘧烏梅飲子方 烏梅酸 桃柳心路 葱白七 豉合 甘草柴胡

知母 路四 大黃分三

右八味各細剉以童子小便兩茶椀宿浸明旦早煎三兩沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海

藻菰菜

又療溫瘧瘧疾瘧久不差黃連散方 宣州黃連二 右一味搗節末以濃酒一盞調三錢空心頓服相次

更服三錢更飲三兩盞酒任意醉却睡候過時方得食如渴枳實煎湯併三日服差忌豬肉冷水

間日瘧方二首

尚德按
是後者
醇是前
者注
疑

尚德按
二十金
作

病源此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕出是以間日而作也出第十卷中

備急療間日瘧方 燒黑牛尾作灰酒服方寸匕日三服出第十卷中

又桂廣州法醇醕湯方 大黃仁甘草常山各半右三味以水三升煮取一升去滓更以水二升煮

滓取一升未發服醕醕是後煮者相次服醇醕是前煮者差忌菰菜海藻生葱生菜等是云極驗文也桂心一分半出第二卷中

久瘧方八首

病源夫瘧皆由傷暑及傷風所為熱盛之時發汗吐下過度腑藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不

差仍故休作也瘧歲歲發至三歲發連日發不解脅下有痞瘵之不得攻其痞但得虛其津液先其時發

其汗服湯已先寒引衣自覆汗出小便自利則愈也出第十卷中

深師療久瘧難斷香豉丸方 香豉一分常山仁蜀漆分附子一分大黃二分右五味擣下篩蜜和發

日早服五丸如梧子須臾又服五丸發晚者至發可三四服令其得吐為佳欲不即斷畏吐者但則長

將久服無不差也忌生葱生菜豬肉

又療三十年瘧常山湯方 常山 黃連各三右二味切以酒一斗宿漬之向晚以瓦釜煮取六升一

服八合比發時令得三服有熱當吐有冷當下服之者千百無一不斷亦可半合無服全劑者忌豬肉

冷水生葱生菜出第二卷中

千金梔子湯主瘧經數年不差者兩劑差一月以來一劑差方 梔子料四常山三車前葉二十枚林米

枳四右四味切以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為差不

止冷飲止之忌生葱生菜出第十卷中

外臺祕要

卷五

久瘧方八首

崔氏療瘧縱久患者不過五六服以來亦差常山散方 常山三乾漆三兩牡蠣半桂心三橘皮二

杏仁二兩去 右六味搗篩為散一服方寸匕先發熱飲和服若先寒清酒和服之時取未發前一食

頃服服藥日唯須晚食七日內慎如藥法忌生蔥生菜卷中第四

備急龍骨丸療久瘧不愈者方 龍骨一常山三 附子二分 右四味搗末以鷄子黃丸如梧子

先發臨發各飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年瘧忌生蔥生菜豬肉等張文仲方同

備急療瘧連綿積日不差常山散方 常山 羚羊角二兩 烏梅肉三 黃芩二 甘草半兩 右五味搗

為散以竹葉煮取六七合飲及熱用調常山散三方寸匕未發前一服若差停不差臨欲發又進二寸

匕老小以意量之忌海藻菰菜生蔥生菜

又療瘧無問年月遠近並差烏梅丸方 烏梅肉二 茯苓 桃仁二 常山三 升麻二 桂心 甘草二

右七味搗篩蜜和丸如梧子大未發時酒服二十九丸欲至發時更服二十九丸百無所忌唯觸之則

難差飲服亦得此藥或吐利或不吐利勿怪五六日頻進佳忌海藻菰菜生蔥生菜文仲方有或三兩熱

第一 卷中

近效療久難差瘧常山酒方 常山三 鱖魚甲二 烏賊魚骨各一 烏梅肉七 桃仁四十九枝去

泥竹葉切一 豉三合 葱白切一 右九味細切合以酒三升清經再宿空腹早朝溫服一合良久取

吐如不吐至齋午以來服之四服如不差隔日更依前服必差差後十日內不得喫冷水粘滑人莧生

菜餘如常梁瀨

勞瘧方三首

病源凡瘧積久不差者則表裏俱虛客邪未散真氣不復故疾雖暫久小勞便發也出第十

肘後瘧勞瘧鼈甲酒方 鼈甲二兩 常山三 蜀漆二 烏賊魚骨二 附子各一 知母二 椒一兩 右七味切

以酒三斗清一宿平旦服一合稍稍加至二合日三四服忌莧菜生蔥生菜豬肉並出第

千金勞瘧積久不斷眾療無效此方療之 長生大牛膝一虎口切以水六升煮取二升分再服第一服

尚德按要
略瘡多寒
者名北瘡
外臺似瘡
又接要略
無此方
尚德按十
金名蜀椒
散用蜀椒
不用蜀漆
又按方後
用千金文
故字下千
金有順字

尚德按
疑當作以
下同

取未發前一食頃服第二服臨發服

張文仲肘後同
出第十卷中

集驗療一切瘡勞瘡無問年月深遠阿魏散及丸方

阿魏 安息香 蘿蔔子 略二 燕薹合 右四味

搗篩為散以煖水服半錢如不能散服蜜丸熟水下三十九須臾吐忌冷水如吐不止喫蒜薺餅飢仍

以貼子盛散一錢男左女右繫臂上立差

出第三
卷中

北瘡方二首

仲景傷寒論北瘡多寒者名北瘡牡蠣湯主之方

北瘡 熱麻黃 各四兩 甘草 炙 蜀漆 各三兩 若無

四味切以水先洗蜀漆三遍去腥以水八升煮蜀漆及麻黃去沫取六升內二味更煎取二升去滓溫

服一升即吐勿更服則愈忘海藻菰菜

又療北瘡蜀漆散方

蜀漆 洗去雲母

龍骨

右三味等分搗篩為散先未發前一炊以清酢漿水和

半錢服臨發時更服一錢溫瘡者加蜀漆半分雲母炭火燒之三日三夜用

雲母一作雲實並
出第十五卷中

一切瘡方四首

崔氏療一切瘡大黃丸方

大黃 三兩 朴硝 二兩 巴豆 一兩 去皮熬

右三味搗篩大黃朴硝然後內巴豆以

蜜和搗二千杵丸如梧桐子大米飲下兩九日二服不斷再服即差忌蘆薈野豬肉等物

救急療一切瘡常山湯方

常山 三石 石膏 八兩 白林米 一石 二

淡竹葉 一石 右四味以水八升漬一宿

煮取二升五合去滓分溫三服清旦一服欲發一服正發時一服三服訖靜室中臥莫共人語過時後

洗手面與食七日禁勞生蔥生菜酒及熱麵毒魚久瘡不過再劑一方加烏梅二十七枚熬之

集驗瘡
或反

發出就大夫
出第一卷中

古今錄驗療一切瘡大有驗硃砂丸方

硃砂 一兩 蜀常山 三兩

右二味各搗下篩畢別取硃砂瓷器中細

研可一日研如麴白蜜和重兒搗一萬七千杵訖作丸如梧子大一服三丸用清酒下行五十餘步隨

意坐臥無酒湯下亦得唯須暖將息病人氣力強仍不廢行動者則須於當發日服之如似日西發者

外臺祕要

卷五

灸瘧法一十三首

臨發之日勿食平旦服三九已時服三九午後更服三九則差若不差必定輕微更服則差餘時發者準此日西一時任意消息其病人氣力微弱者不得臨發日服應預前一日服之如似明日發者今日平旦空腹服三九至齋時食一椀粥至日西更服三九至日暮復食一椀淡粥並不得飽食至一更盡更服三九至平時食粥一椀至齋前更進三九不得食至午時更進三九必差差後三日以來唯得食甜粥飲漿忌生冷酢滑膩麪及飽食七日以來特忌生血物生蔥生菜若後七日餘者漸食生冷二種須復日禁若如百日來患差後還須百日禁忌生冷乃至七日患者差還復禁七日生冷患來雖經多年但得百日以來禁生冷過百日後得食無妨若不禁者必還重發患來日久極重者不過十服差近者三五服則差病人十五以上者一服三九十五以下七歲以上者一服兩九七歲以下者一服一九如小者分此一九九作二小九服之

此第四

近效加減瘧一切瘧無不效比用不過再服八口如神萬不一失桃仁常山丸方 桃仁二兩不熟亦不

常山二兩豆豉三

右三味各別搗五六百杵又和更搗六七百杵然後煎好酒如黑泥自成丸不飲酒

事須酒下三十九丸如梧子未發前服臨發更服三十九丸以手捧之於鼻下嗅取氣便定如不得平復更服三十九丸或吐或微利勿怪亦有不利差者吐了仍不得漱口亦不得喫生蔥生菜菓子甜物油膩等却發則難差此來者不過再三服便差一服差者多其常山須蜀者始堪使用桃仁須是毛桃仁餘者即無效鼓須新美不用陳者渴者取烏梅三枚作漿稍稍咽三五咽其藥唯一人患則少合不堪預合無力不效今方有常山一兩桃仁五七枚鼓一合恬多者佳瘧常山作散訖次研桃仁作泥別搗鼓點酒搗三五百杵次一處和搗又六百杵以來如法服之

瘧人更便

灸瘧法一十三首

千金瘧瘧灸法

灸上星及大椎大椎穴在背從第一至發時令滿一百壯艾炷如黍粒俗人不解取穴

務大炷

又接恬疑當作粘

尚德接此疑當作比

又法 覺小異則灸百會七壯若後更發又灸七壯極難愈者不過三灸

又法 以足躡地以繩圍足一匝中折從大椎向百會灸絃頭三七壯炷如小豆許大

又法 灸風池二穴各三壯

又法 從手發者灸三間穴在虎口第二指節根下一寸三年瘕瘕欲發慘慘則下火

又法 從頭項發者未發前預灸項大椎絃頭漸灸過時止

又法 從腰發者灸腎俞百壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是

又法 一切瘕無間遠近法 正仰臥以繩量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右灸

又法 五藏瘕及一切諸瘕法 灸尺澤七壯穴在肘中筋動處是也

又法 瘕瘕瘕法 上星主之穴在鼻中央直入髮際一寸陷容豆是也灸七壯

又法 瘕瘕日而發者法 臨泣主之穴在目眦上入髮際五分陷者中是也灸七壯

又法 瘕瘕多汗腰痛不能俯仰目如脫項如拔者法 崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中是也灸三壯

又法 瘕瘕實則腰痛虛則鼻衄法 飛揚主之穴在外上七寸灸七壯並出第十卷中

瘕瘕法六首

千金瘕瘕法 未發前抱大雄雞一隻著懷中時時驚動令雞懷中作大聲無不差肘後同出第十卷中

崔氏書瘕法 平旦日未出時閉氣書之先書額上則戴九天次書兩手心作把九江又書背上從右脾

骨下向左分作兩行書之一如後法南山有一木木下不流水水中有一魚三頭九尾不食五穀唯噉

瘕鬼急急如律令

又法 書兩脚心下作履九江 右以前法既不損人又無不差者其有一度書不甚差可更書之書符必

不得脫錯亦不可重點畫不成也又勿食五辛書瘕法諸州滿上人傳云妙不可道以下二法余用俱效

又法 令所患人未發前正南北眠頭向南五心并額及舌上七處閉氣書鬼字則差隨意任東西肘後目後

又法 總書八行其下七行一準前行通而為八山題子山題子山題子山題子準前計更有七行通前為八行此符厭瘧鬼一去千里外急急如律令某年某月某州某縣某鄉某里姓名牒姓名則所患人也右以手把符勿開男左女右待過時久然後任開其符仍以火燒却

呪瘧法

候病者發日日出時自執一石於水濱一氣呪云腎腎團團行路非難捉取瘧鬼送與河官

急急如律令即投石沉於水中勿反顧而去

並出第
四卷中

元希聲侍郎集驗書瘧法

額上書兩金字重胸前書兩大字並背上書兩水字並兩手書木字單兩足

下各書王字齊下作四口字重右含水閉氣用朱書未發前書之有驗

許仁則療瘧方四首

許仁則此病之候乃有數種亦有宿患瘧飲食失宜因節氣初交亦生此病亦有痰癖積聚久不通散冷熱相攻亦生此疾亦有地居卑濕時屬暑熱內有宿病外感惡氣亦生此疾亦有盛夏蒸熱飲冷熱間隔秋夏氣交亦生此疾以要言之終由飲食失常寒暑乖宜上熱下繫將瘧之方吐下為本人有強羸病有輕重自須臨時斟酌不可一槩言之此病別有所稱瘧而差者自是人心妄識畏愛生病亦猶弓影成蟲耳必有不誣此法專意信之亦任其從穰穰之道雖然必須資藥以救之比見用藥攻療無不差者以法禱之則有不效者以此言之明知病在於內徒勞於外耳此病之始與天行不多別亦頭痛骨肉酸楚手足逆冷口鼻喉舌乾好飲水毛聳腰脊強欲反拗小便赤但先寒後熱發作有時可不審察其發作日有準凡經七日以後先服蠶甲注用常山等五味散取快吐方甘草 松蘿 各二 桂心 一右藥搗篩為散煮烏梅湯下初服一方寸匕日二服稍稍加之以得吐為限忌人菴生蔥生菜海藻菰菜

又審其候若體力全強日再服每服皆取吐自覺氣力不甚強則每一服取吐晚不得服如全綿惛事須取吐則三兩日一服經五六度吐訖但適寒溫將息并食飲使體氣漸強若知病雖輕吐根本未似得除

事須利之以洩病勢宜合當歸等六味散服之取利方 當歸 白朮各五兩 細辛四兩 桂心三兩 大黃五兩 朴硝

四兩 右藥搗篩為散平旦空肚以酒飲下初服一方寸匕日再服稍稍加之得利為度候氣力強羸取

利多少一一如前取吐法忌桃李雀肉生葱生菜

又依前驚中等五味散取吐當歸等六味散利後雖經吐下其源尚在如更吐利又慮冠羸宜合鬼前羽

等十味丸服之方 細辛 橘皮各四兩 鬼箭羽斷續之如金 白朮五兩 桂心 地骨皮各四兩 蜀漆二兩 甘草三兩

多當歸五兩 丁香三兩 右藥搗篩蜜和丸如梧子煮烏梅飲下之初服十五丸日再稍稍加至三十九服

經三五日後若覺熱甚每服藥後良久任喫三兩口粥飲壓之忌海藻薤菜桃李雀肉生葱

又療此病曾用釋深師一方大有效其方有巴豆皂莢藥蘆三味作丸服雖經困若一服永斷吳昇同並出第一卷

中

唐王燾先生外臺祕要方卷六目錄霍亂及嘔吐二十九門

霍亂病源論三首

霍亂臍上築方三首

霍亂不止及洞下洩痢方八首

霍亂煩躁方八首

乾濕霍亂及痰飲方五首

霍亂煩渴方四首

霍亂轉筋方一十四首

三焦脉病論二首

中焦熱及寒洩痢方三首

下焦虛寒方六首

雜療霍亂方四首

嘔噦方四首

嘔逆吐方八首

許仁則療嘔吐方四首

噎醋方七首

霍亂吐痢方一十二首

霍亂腹痛吐痢方七首

霍亂後脉絕手足冷方四首

霍亂衆藥療不效方二首

霍亂心腹痛方三首

霍亂乾嘔方五首

霍亂雜灸法二十六首

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

下焦熱方六首

許仁則霍亂方三首

乾嘔方六首

噦方七首

嘔逆不下食方八首

雜嘔吐噦方三首

唐王燕先生外臺祕要方卷六

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程行道敬通父訂梓

門人鄭康辰真乙父全校

霍亂病源論三首

病源霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先痢心腹並痛者則吐痢俱發扶風而實者身熱發頭痛體疼而復吐痢虛者但吐痢心腹刺痛而已亦有飲酒食肉好餐腥膻生冷過度或居處不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便生吐痢水穀不消則令心腹脹滿皆成霍亂霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三名走哺言其哺食變逆者也診其脈來代者霍亂又脈代而絕者亦霍亂霍亂脈大可療微細不可療霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可療也養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂

出第二十卷中

千金論曰原夫霍亂之為病也皆因食飲非關鬼神飽食脫膾復餐乳酪海陸百品無所不啖眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲降陰氣欲升陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆為迴轉論證雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以喻之也養生者宜達其旨趣庶可免於天橫者矣

又凡霍亂務在溫和將息若冷則遍體轉筋凡此病定以後一日不食為佳仍須三日少少喫粥三日以後乃可恣意食息也七日勿雜食為佳所以養脾氣也

出第二卷中

霍亂吐痢方一十二首

兩一升上
宋本並有
切字

下宋本作
服

一握燒焦
宋本作一
枝如鴨子
大燒令焦
口字下宋
本有寸切
之三

生字下宋
本有去皮
破八片五
字宋無如
至之加字
制紫以下
八字宋本
在下宋本
之代

廣濟療霍亂吐痢扁豆湯方 扁豆葉升香薷葉升木瓜一枚乾薑兩 右四味以水六升煮取二升五合

絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里並無所忌

又療冷熱不調霍亂吐痢宿食不消理中丸方 人參 白朮各八分甘草八分乾薑六分高良薑六分桂心六分

右六味搗篩蜜丸空腹以飲下梧子大三十九日二服漸加至四十九丸老小以意減之忌生冷油膩生

蔥海藻茹菜桃李雀肉等物

又療霍亂冷熱不調吐痢高良薑湯方 高良薑兩五木瓜一枚杜梨枝葉三 右三味切以水六升煮取二

升絞去滓空腹溫三服服別如人行六七里無所忌並出第

小品霍亂吐痢心煩亂髮湯主之方 亂髮一握人參兩一吳茱萸升甘草一兩 右四味切以水三升酒

二升煮取二升絞去滓溫服五合忌海藻茹菜

又療霍亂吐痢已服理中及四順湯不解者以竹葉湯方 竹葉一虎小麥升一生薑兩十甘草一兩人參一兩

附子地一兩肉桂當歸各二芍藥兩一白朮兩三橘皮兩二 右十一味以水一斗半先煮小麥竹葉取八升

汁去滓內諸藥煮取二升半分三服吐痢後腹滿加厚朴二兩炙上氣加吳茱萸半升差理中四順則

大熱熱毒霍亂宜竹葉湯忌生蔥海藻松菜猪肉桃李雀肉等錄金古今

又霍亂吐痢而汗出小便復利或下利清穀裏外無熱脉微欲飲絕或惡寒四肢拘急手足厥逆四逆加猪

膽湯主之方 甘草二兩乾姜炮附子一枚猪膽汁合 右四味切以水二升煮取一升四合溫分再

服無猪膽以羊膽代之強人可與大附子一枚乾薑加至三兩若吐之後吸吸少氣者及下而腹滿者

加人參一兩諸藥皆減為一兩如證者亦宜與理厥人參湯佳忌海藻松菜猪肉錄金

又四順湯與前療同常用此方 人參三兩宋本一兩甘草三兩宋本一兩乾薑三兩宋本一兩附子二兩宋本一兩

用一 右四味切以水六升煮取二升絞去滓溫分三服轉筋肉冷汗出嘔噦者良忌海藻茹菜猪肉錄金

同制紫范汪方云利
甚者加龍骨二兩妙

尚德按仲
景無此論
即千金之
文按傷寒
論人參三
兩

宋本無亂
字

又白丸療霍亂嘔吐及暴痢良方 半夏三兩 附子炮四兩 乾姜炮四兩 人參三兩 桔梗二兩 右五味作散臨病

和之若吐痢不止者以苦酒和之飲服二九如梧子不差復服耐藥者加之以意下者用蜜和丸亦得

忌猪羊肉錫范同並出

崔氏理中丸療三焦不通嘔吐不食并霍亂吐逆下痢及不得痢惡主之方 人參三兩 乾薑二兩 白朮三兩

甘草三兩 右四味搗篩蜜和丸如梧子平旦取粥清服五九日再服一方乾薑三兩忌海藻菰菜桃

李雀肉等卷中

延年理中丸療霍亂吐痢宿食不消方 白朮二兩 乾薑二兩 人參二兩 甘草二兩 大麥二兩 右五味搗

篩蜜和為丸以飲服十五九如梧子大日再服稍加至二十九忌海藻菰菜桃李雀肉等卷中

必效理中散主霍亂及轉筋吐痢不止方 青木香各八分 桂心 厚朴 甘草各八分 白朮八分 乾薑十分 附子

炮六分 右七味搗篩為散飲服兩錢匕如人行五六里不定更服一錢匕差止忌海藻菰菜生葱猪肉

桃李雀肉等

又方 若熱霍亂則渴心煩欲得冷水喫則宜恣意飲冷水及土漿取足定止

霍亂臍上築方三首

病源霍亂而氣築悸者由吐下之後三焦五藏不和而水氣上乘於心故也腎主水其氣通於陰若吐下

則三焦五藏不和故脾氣亦虛不能制水水不下宣與氣俱上乘心其狀起臍下上從腹至心氣築築然

而悸動不定也出第二十卷中

仲景論霍亂臍上築者腎氣動也先療氣理中湯去朮加桂丸方加朮者以內虛也加桂者恐作奔豚也

理中湯方 人參二兩 甘草三兩 白朮三兩 乾薑三兩 右四味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

夜一若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩若下多者復用木悸者加茯

苓二兩若先時渴喜得水者加朮合前成四兩半若腹中痛者加人參合前成四兩半若惡寒者加乾

宋本炮字
下有去皮
破六片五
字洗字下
有完用二
有按字下
有按字下
字在下七
卷中下

尚德按十
金煎汁服
一升
尚德按十
金煎汁服
一升
外服三十

外字下宋
本有八土
者三字

霍亂腹痛吐痢方七首

薑合前成四兩半若腹滿者去木加附子一枚炮去皮破六片服湯後一食頃飲熱粥一升許汗微出
自溫勿發揭衣被也忌海藻菰菜桃李雀肉等千金備急文仲崔氏集驗必發小品古今錄驗並同

又霍亂臍上築者以吐多故也若吐多者理中湯主之方如前法加減霍亂四逆吐少嘔多者附子梗米
湯主之方 附子附子炮附子半夏半夏甘草甘草一兩大棗枚梗米枳枳右五味切以水八升煮米熟去滓溫服一

升日三忌羊肉猪肉海藻菰菜錫一方有乾薑一兩小品出第十七卷中 茯苓二甘草三兩乾薑一兩人參兩木瓜兩右五味咬咀

范汪療霍亂臍上築而悸茯苓理中湯方 茯苓二甘草三兩乾薑一兩人參兩木瓜兩右五味咬咀

以水六升煮取三升去滓適寒溫分為四服忌海藻酢物出第四卷中

霍亂腹痛吐痢方七首

廣濟療霍亂吐痢方 取桃葉切三升以水五升煮取一升三合分溫二服出第四卷中

范汪理中加二味湯療霍亂胸滿腹痛吐下方 人參三兩乾薑三兩甘草三兩白朮三兩當歸芍藥各二

右六味咬咀以水七升煮取三升絞去滓溫服一升日三甚良忌海藻菰菜桃李雀肉等

又主霍亂腹痛吐下方 取桃葉冬取皮煎汁服一酒杯有效千金云將絞取汁一升

千金理中湯療霍亂吐下脹滿食不消心腹痛方 人參三兩白朮三兩甘草三兩乾薑三兩右四味以水六

升煮取三升絞去滓溫分三服不差頻進兩三劑遠行防霍亂作丸如梧子服二十九散服方寸匕酒

亦得若轉筋者加石膏三兩忌海藻菰菜桃李雀肉等與前仲景方同加減別備急集驗小

備急療霍亂吐痢高良薑酒方 高良薑大炙令焦香每用五兩打破以酒一升煮取三四沸頓服亦療

霍亂腹痛氣惡崔氏延年同 救急療霍亂初覺不好則用此方主腹痛吐痢香薷湯方 生香薷切一小蒜碎升厚朴切兩生薑切

右四味切以水一斗煮取三升分三服得吐痢止每服皆須溫如吐痢不止用後方

又薤根湯方 生薤根切一生薑斤橘皮五右三味切以水八升煮取二升分二服服別相去以意消

息之一並出第
一卷中

霍亂不止及洞下洩痢方八首

病源霍亂而下痢者是冷氣先入於腸胃腸胃之氣得冷則交擊而痛故霍亂若先腹痛者則先下痢也

出第二十
二卷中

廣濟療霍亂不止方 取酢漿水三升煮取一升五合內米粉一抄攪調分二服服別相去如人行三四

里出第四
卷中

小品霍亂卒吐下不禁脈暴數者人參湯主之方 人參 茯苓 葛根 陳皮各二兩 麥門冬去心甘草

二兩

刪繁療霍亂洞泄不止臍上築築腎氣虛人參理中湯方 人參 乾薑各三兩 茯苓兩 橘皮兩

桂心兩 黃耆兩

四卷

又療中焦虛寒洞泄人參湯補虛泄方 人參三兩 甘草二兩 黃芩二兩 當歸三兩 茯苓 乾薑各四兩 厚朴四兩

芎藭三兩 粟米升

右九味切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下諸藥煎取三升分三服忌海

藻菰菜大酢等物 又療中焦洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛黃連湯方 黃連四兩 黃柏三兩 當歸三兩 厚朴二兩 石

榴皮四兩 乾薑三兩 地榆 阿膠各四兩

猪肉冷水四卷中

千金療霍亂洞下不止方 取艾一把水三升煮取一升頓服之 備急同出第
二十卷中

延年增損理中丸主霍亂下氣能食止洩痢方 人參 白朮 厚朴炙 茯苓 甘草各六兩 薑屑分 右

六味擣篩蜜和為丸如梧子大一服十九飲下酒下亦得加至十五二十九忌生冷海藻菰菜桃李雀

黃連上宋
本有金色
二字
石榴上宋
本有酸字

霍亂不止及洞下洩痢方八首

三

阿膠三兩
下宋本云
碎熬令黃
然後末

生子下宋
本有去皮
破六片五
尚德按此
證仲景用
通豚四逆
加猪膽汁
湯通豚四
逆湯及後
在少陰病
中與此證
小異

女臺初

肉大醋出第六卷中

必效療霍亂水痢腹中雷鳴無不差烏梅黃連散方 烏梅肉 黃連 熟艾葉各三兩 赤石脂二兩 當歸

甘草炙各附子二兩阿膠炒三兩

右八味搗篩為散有患者每服二方寸匕疑熱則飲下疑冷則酒下

忌海藻菰菜猪肉冷水出第二卷中

霍亂後脈絕手足冷方四首

病源霍亂而大吐下後其腸胃俱虛乃至汗出其脈欲絕手足皆冷名為四逆四逆者謂陰陽卒厥絕也

出第二十卷中

仲景傷寒論既吐且痢而大汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脈微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手

足厥逆者四逆湯主之方 甘草炙二兩附子一枚乾薑半兩 右三味切以水三升煮取一升二合去滓

溫分二服加減依後法忌海藻菰菜猪肉出金

又吐已下斷汗出厥冷四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯主之方 甘草炙二兩 大附子一枚 破六

片乾薑三兩 右三味以水三升煮取一升二合去滓溫分二服其脈即出愈若面色赤者加葱九莖

若腹中痛者去葱加芍藥二兩若嘔者加生薑二兩若咽痛者去芍藥加桔梗一兩若利止脈不出者

去桔梗加人參二兩病皆與方相應乃合服之若吐利止身疼痛不休者消息和其外傷寒論中又有

療諸發熱霍亂者審取之忌海藻菰菜猪肉仲景傷寒論上雖合用通脈四逆加猪膽湯又吐利止身

痛不休者消息和解其外宜桂枝湯和之並出第十七卷中

品扶老理中散并作丸長服亦得療羸老冷氣惡心食飲不化腹虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥小

冷心煩氣悶流汗悉主之方 人參 乾薑 白朮 芍藥 附子 炮 茯苓 三 甘草 五 右七味

作散臨病煮取三合白湯飲和方寸匕一服不效又服常將蜜丸酒服如梧子二十九忌海藻菰菜猪

肉桃李雀肉大醋十金同出第四卷中

霍亂後脈絕手足冷方四首

尚德按三十
金烟生三
兩生薑一
十五枚
大棗二
十枚
又按千金
云篇方用
藥三十枚
云云

或時後作
若宋本同
尚後按時
有無新藥
者得本
七字家
同

亂髮下宋
本云握如
雞子熱今

千金四逆湯主多寒手足厥冷脉絕方 吳茱萸二兩當歸 桂心 芍藥各三兩細辛 通草各二兩生薑八兩

甘草二兩大棗十二枚右九味切水六升清酒六升合煮取三升分溫四服舊方棗二十五枚今以

霍亂法多瘡故除之若除棗入葛根二兩佳忌生葱生菜海藻菰菜小品同仲景傷寒論此方名當歸四逆加吳茱萸生薑湯

霍亂煩躁方八首

病源霍亂之後煩躁卧不安者由吐下之後腑臟虛極陰陽未理血虛氣亂故血氣之行未復常度內乘

於腑臟故煩躁而不得安卧也出第二十卷中

肘後霍亂後煩躁卧不安葱白大棗湯方 葱白二十莖大棗二十枚右二味以水二升半煮取一升去滓

頓服之文仲

又療霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方 生薑或乾薑一小升 右一味以水五升煮三沸頓

服若不即愈可更作

又方 桂心屑半升以煖飲二升和之盡服忌生葱第二卷中並出

又仲療霍亂煩躁方 濃煮竹葉飲五升令灼灼爾以淋轉筋處肘後備急同

又方 服乾薑屑三兩方寸匕肘後備急同

又方 小蒜一升以咀水三升煮取一升頓服之肘後同並出第二卷中

備急療霍亂煩躁方 黃梁米粉半升水一升半和攪如白飲頓服糯米亦得

又方 燒亂髮如雞子大以鹽湯三升和服之不吐復服卷中第一

霍亂眾藥療不效方二首

小品療霍亂諸藥不能療亂髮湯方 亂髮握一握小蒜十四枚附子一兩甘草二兩右四味切以水六升

煮取三升去滓溫分三服忌猪肉海藻菰菜卷中第四

千金人參湯療毒冷霍亂吐痢煩嘔轉筋虛冷汗出手足指浮腫氣息垂絕絕語音聲不出百方不效脉

高德扶十
金十味各
二兩

六十枚下
末本云去
心皮煎所
如脂

不通者服此湯取差乃止隨吐者續更服勿佳方

人參 附子 厚朴 炙 茯苓 甘草 炙 橘皮 當歸

葛根 各二兩 桂心 乾薑 各三兩

右十味以水七升煮取二升半分溫三服忌海藻菰菜生葱大酢

中卷

乾濕霍亂及痰飲方五首

病源霍亂者多吐痢也乾霍亂者冷氣搏於胃飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐

痢名為乾霍亂也

出第二十卷中

救急療霍亂無問乾濕冷熱等木香湯方

青木香 各三兩 高良薑 二兩 豆蔻子 枚 右三味咬咀以水一大

升煮取半升頓服之則定

又方 取烏牛屎二兩以水二升煮沸絞濾頓服之大良

又生薑湯方 以東壁土一把生薑一大兩碎之 右二味用水一大升煮取半升澄清熱飲之如渴依

前進

並出第一卷中

必效療上吐下痢者名為濕霍亂方 黃牛屎半大升許取水一大升煮三兩沸和牛屎濾取汁服半升

即止犁牛子屎亦佳無牛處常將乾者相隨亦好用

備急產氏范注同出第三卷中

又四神丸主霍亂冷實不除及痰飲百病無所不主方

乾薑 桂心 各一兩 附子 一枚 已豆 六十枚 製

右四

味末之蜜和為丸如小豆大飲服二丸取快下不下又服一九忌生葱野猪肉蘆笋

胡洽同出第四卷中

霍亂心腹痛方三首

病源霍亂而心腹痛者是風邪之氣客於臟腑之間冷氣與真氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也

二卷中

廣濟療霍亂心腹痛煩嘔不止厚朴人參湯方

厚朴 炙 橘皮 人參 各二兩 高良薑 當歸 藿香 各

兩

右六味以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生冷粘膩

出第一卷

尚德按並
疑當作出

尚德按並
疑當作出

中

肘後療霍亂若絞痛不止方

薑二莖二莖二

合搗中分為兩分手捻令如粉熬令灼灼爾更番以熨臍中

取愈

並第一卷中

千金霍亂蠱毒宿食心腹痛冷氣鬼氣方

枳實鹽湯三升一味霍亂心腹暴痛宿食不消積冷煩滿者

熱飲一升以指刺口令吐宿食使盡不盡更服吐訖復飲三吐住靜止此法大勝諸藥俗人以為田舍

淺近法鄙而不用守死而已凡有此疾即須先用之

備急霍亂方卷中

霍亂煩渴方四首

病源霍亂而煩渴者由大吐逆上焦虛氣不調氣乘於心則煩悶也大利則津液竭津液竭則藏躁藏躁

則渴也煩渴不止則引飲引飲則利亦不止

出第二十卷中

肘後療霍亂吐下後大渴多飲則殺人方 黃粱米五升水一斗煮之令得三升汁澄清稍稍飲之勿飲

餘飲

備急同糯米亦得第二卷中

備急近效療霍亂不吐不下食氣急而渴方

木瓜一枚切以水四升煮取二升細飲盡更作吐不止

者亦差若渴唯飲此湯佳根莖亦可用此湯令人吐

崔氏張文仲同出第一卷中

必效霍亂渴方

糯米二升濤取泔飲訖則定若不渴不須一方渴者服之并當飽又云所糯米取自汁

恣意飲之以差為度

崔氏張文仲同出第三卷中

又療霍亂後渴口乾腹痛不止者厚朴桂心湯方

厚朴炙兩桂心兩

右二味切以水四升煮取一升

二合絞去滓內分六合細細飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之

長安博士府常服志生慈出第二卷中

霍亂乾嘔方五首

病源霍亂而乾嘔者由吐下之後脾胃虛極上焦不理氣痞結於心下氣時逆上故乾嘔乾嘔者謂欲嘔

而無所出也若更遇冷折折胃氣胃氣不通則變噦也

出第二十卷中

霍亂煩渴方四首

霍亂乾嘔方五首

五

肘後瘳苦嘔不息方 取薤白一虎口切以水三升煮令得一升半服之不過三度備急

又乾薑茶葉湯方 乾薑切吳茱萸各二兩 右二味以水二升煮取一升頓服之下不止手足逆冷者加

椒百粒附子一枚炮水三升煮取一升頓服出中

刪繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯方 厚朴四兩乾扁豆葉二兩茯苓三兩白朮五兩人參三兩 右

五味切以水七升煮取二升分三服忌桃李大醋雀肉等出中

千金療霍亂引飲後輒乾嘔方 生薑五兩水五升煮取二升半分二服又煮高良薑飲之佳延年秘

小品崔氏張文仲 同出第二十卷中

經心錄療霍亂後煩嘔厚朴湯方 厚朴二兩生薑三兩枳實三兩 右三味切以水六升煮取二升分三

服出中

霍亂轉筋方一十四首

病源霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也足之三陰三陽之筋起於足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於身夫霍亂大吐下之後陰陽俱虛血氣虛極則手足逆冷而榮衛不理冷搏於筋則筋為之轉冷入於足之三陰三陽則脚筋轉入於手之三陰三陽則手筋轉隨冷所入之筋筋則轉轉者由邪冷之氣擊動其筋而移轉也又轉筋者由榮衛氣虛風冷搏於筋故也手足之三陰三陽之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽虛者風冷邪氣中其筋隨邪所中之筋筋則轉轉者謂其轉動也經云足太陽下血氣皆少則喜轉筋若踵下痛者是血氣少則陽虛虛而風冷乘之故也診其左手關上肝脉也況為陰陰實者肝實也若肉動轉筋左手尺中名神門以後脉足少陰經也浮為陽陽虛者病苦轉筋其湯熨針石別有正方補養宣導令附於後養生方導引法云偃臥展兩腰兩手外踵者相向令鼻內氣自極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋又云覆臥傍視立兩踵伸腰鼻內氣去轉筋又云張腰兩足指號五息止令人不轉筋極自用力張脚痛挽兩足指號言寬大去筋節急攣變痛久行身開張又云覆臥傍視立兩

仲病源作
坐宗宋同

一兩下宋
本云灰汁
洗却膩

尚德按到
肘後作
下同

轉字上肘
後有如欲
二字宋本

止有按肘
後三兩作
一兩累搏

作臂一外
按升半大
肘後而注

云肘後云
云同可疑
此轉本上

四字宋本
作黃龍藤
者梓木六

尚德按作
字千金在

踵伸腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋酸疼一本云療脚弱出第二十卷中
廣濟療霍亂吐痢轉筋欲入腹高良薑湯方 高良薑 桂心各四兩 右二味切以水七升煮取二升去

滓分三服如人行四五里一服忌生冷生葱

又療霍亂轉筋不止茱萸湯方 吳茱萸升甘草炙乾薑二兩各 藜子一兩 亂髮燒兩 桂心二兩 右六味切以

水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱海藻蒜菜生冷粘膩等

又療轉筋方 取故綿多取醞醋醎中蒸及熱用裹病人脚冷更易勿停差止第十卷中 出

肘後療兩臂脚及胸脅轉筋者方 取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼爾清手足在胸脅者湯洗之轉筋

入腹中到擔病人令頭在下腹中平乃止若劇者引陰陰縮必死猶在到擔之可冀活耳

又方 煮苦酒三沸浸斃裏轉筋上合少粉尤佳又以綿纏膝下至足備急同

又若轉筋入腹中轉者佳 取雞屎白一方寸匕水六合煮三沸溫頓服勿令病者知仲景心錄備

又若霍亂注痢不止而轉筋入腹欲死者方 生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服之肘後小出第二

卷中

刪繁療舌強筋縮牽陰股引胸腹脹痛霍亂黃龍藤湯方 黃龍藤切一升此梓木上藤也斷以吸

右一物以水四升煮取八合為一服一劑不止更至一劑良驗或宿食不消霍亂或乾霍亂或吐痢不

止或不吐利並悉療之出第三卷中

千金霍亂轉筋入腹不可奈何方 極鹹作鹽湯於糟中煖漬之則差小品集驗同 又

又方 以醋煮青布揗脚膝冷復易之備急文仲崔氏小

又方 蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服急同並出第二十卷中

救急霍亂脚轉筋絕四肢已冷強氣絕心上微暖者猶可救之方 取硃砂二兩熟研蠟三兩和之為丸

待冷著大籠中如熏衣被厚覆勿令煙洩兼牀下著火令腹微暖徹良久當汗則漸氣通便活忌生血

物出第一

必效主霍亂脚轉筋及入腹方 以手拘所患脚大母指灸當脚心下急筋上七壯

又方 小瓜子根皮合煮湯服之 出第三卷中

霍亂雜灸法二十六首

肘後療霍亂先腹痛者法 灸臍上四寸壯名太倉在心厭下四寸更度之 千金備急崔氏古今錄驗並同通按銅人經中管一名太

倉在臍上四寸胃募也

又療先洞下者法 灸臍邊二寸男左女右十四壯甚者至三十四壯名大腸募也 千金備急崔氏古今錄驗同

又療轉筋者法 灸脚心下名湧泉 又灸當足大母指聚筋上六七壯神驗 又灸足大指下約中一

壯 千金及同

又療轉筋入腹痛者法 令四人捉手足灸臍左二寸十四壯 又灸股中大筋上去陰一寸

又療若呪方法 臍後按方 灸手腕第一約理中七壯名心主當中指 千金同通按銅人經大都二

又療下痢不止者法 灸足大指本節內側一寸白肉際左右七壯名大都 千金同通按銅人經大都二

又療吐且下痢者法 灸兩乳邊連黑外近腋白肉際各七壯可至二七壯

又療苦煩悶急滿法 灸心厭下三寸七壯名胃管 取仲

又法 以鹽內臍中灸上二七壯 文仲千金同

又療苦燒臍痛急者法 灸臍下三寸三七壯名關元良 岐仲

又療先吐者方 灸心下一寸十四壯又并療下痢不止上氣灸五十壯名巨關正心厭共頭下一寸是

也 千金翼文仲崔氏備急同通按銅人經巨關在臍下一寸心之募也

又療霍亂神祕起死灸法 以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下灸度下頭五壯橫度左右復灸

五壯此三處併當先灸中央畢更橫度左右也又灸脊上以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七

極字上
尚德按
膝二字
金作之
宋本脚
上有之
字

苦肘後作
若家本同

急肘後作
若家本同

若肘後作
若家本同
尚德按方
疑當作法

尚德按此
法千金瘰
先下利者

尚德按黑
字下千金
有白字
金頭按千
有及字無
學字宋本
尚德按逐
千金作近

壯是腹背各灸三處崔氏文

又華佗療霍亂已死上屋喚魂者又以諸療皆至而猶不差者法 捧病人覆卧之伸臂對以繩度兩肘

共頭依繩下夾背脊大骨室中去脊各一寸灸之百壯無不活者所謂灸肘椎空囊歸已試數百人皆

灸畢即起坐佗以此術傳其子孫世世皆秘之不傳千金崔氏備急同

千金凡得霍亂灸之或時雖未立差終無死憂不可逆灸或但先腹痛或先下後吐當隨病灸之

又療霍亂灸法 灸穀門穴在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二七壯不止又灸如前數鍼經甲經

又療吐下不禁兩手三陰三陽脉俱疾數者法 灸心厭骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

又療乾嘔者法 灸間使穴在手掌後三寸兩筋間左右各灸七壯不差更灸如前數肘後文神

又療手足逆冷者法 灸三陰交穴在足內踝直上三寸廉骨際陷中左右七壯不差更灸如前數肘後

又療轉筋不止者法 灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

又療走哺轉筋者法 灸踝白肉際左右各二十一壯 又灸小腹下橫骨中央隨年壯

又療轉筋四厥者法 灸兩乳根黑際各一壯

又療轉筋在兩脅及胸中法 灸手掌白肉際七壯又灸臍中中府巨闕胃管尺澤以上并療筋拘頭足

學者皆愈

又療轉筋不止者法 若是男子手挽其陰牽之女子挽其乳逐左右邊

又療轉筋欲死者方尚德按方疑 令四人手持足灸臍上一寸十四壯自不動勿復持之金作持手

又療霍亂泄痢所傷煩欲死者方 灸慈宮各二十壯慈宮在橫骨兩邊各二寸半橫骨在臍下橫門骨

是也並出第二十卷中通接甲乙鍼經衛門一名慈宮霍亂雜灸法二十六首

救急瘥霍亂心腹痛脹吐痢煩悶不止則宜灸之方 令病人覆卧伸兩臂膊著身則以小繩正當兩肘骨尖頭從背上量度當脊骨中央繩下點之去度又取繩量病人口至兩吻截斷便中折之則以度向所點背下兩邊各依度長短點之三處一時下大灸絕便定神驗艾炷大稍加也

又瘥霍亂轉筋不止漸欲入腹凡轉筋能殺人起死之法無過於灸灸法唯三處要穴第一承筋穴在腓股下際取穴法 以繩從腳心下度至腳踵便截斷度則迴此度從腳踵縱量向上盡度頭當腓下際宛宛中是穴灸三七壯則定 又不止則灸涌泉在足心下當足大指中節後一寸半正當大筋上是穴

又灸足跟後黑白肉交際當中央此三處要穴灸之不過二三七壯必定並出第一卷中

三焦脉病論二首

刪繁論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五藏六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣脾胃之間不可不知也凡上焦三管反射者通三焦名中清之腑也別號玉海水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號為孤之腑也而榮出中焦衛出上焦榮者是經脉之氣道也上焦如霧霧者起於胃上管並咽以上貫膈布胸中走腋循足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明常以榮衛俱行於陽二十五度行陰亦二十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰手少陽也主心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背或出於身手皆不循衛氣之道而出蓋外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之故不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得其道名曰漏泄其病則肘掌痛食先吐而後下氣不續胸膈悶厭悶所以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便利語聲不出若實則上絕於心若虛則引氣於肺第四卷千金同

千金論曰三焦病者腹脹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于脉取委陽少腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉與厥陰小

尚穩按血者下千金有腫上反胃管取三里八字

八兩下家本有碎字

人參上宋本有上黨二字

通按理中湯內有乾薑今無乾薑有生薑人有生薑根不卜何

尚穩按生薑根千金

外臺似誤半升不宋木云洗四

破宋本枚字下有去核二字失字

下有及兩

絡結而血者三焦脹者氣滿在皮膚鼓殼然而不堅手少陽之脉是動則病耳聾輝輝焯焯噎腫喉痹是主氣所生病者汗出目銳皆痛頰痛耳後肩膊肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病寒則留之熱則疾之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎一倍於寸口虛者人迎反小於寸口

出第二卷中

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

刪繁療上焦實熱飲食下胃其氣未定汗出面背身中皆熱名白濁氣通脉瀉熱澤瀉湯方 澤瀉二生

地骨皮 兩五甘草 兩一 半夏 兩二 石膏 兩八 柴胡 茯苓 生薑 兩三 竹葉 切 五 人參 兩二 桂心 兩一 芎藭 心 升

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉錫醋生蔥 同金

大療上焦熱腹滿而不欲食或食先吐而後下肘臂骨痛麥門冬理中湯方 生麥門冬 升一 生薑 兩四 白木

雨五甘草 兩二 人參 兩三 茯苓 兩二 橘皮 兩三 竹茹 生薑 兩各一 藁心 五 姜糖 兩三 廩粟 升一 右十二味切以水

一斗五升煮取三升分三服忌海藻菘菜大醋桃李雀肉等 同金

又療上焦氣不續胸膈間厭悶所以飲食先吐而後下半夏理中續膈破寒湯方 半夏 兩半 升 生薑 兩四 麻

黃 兩前胡 澤瀉 兩三 竹葉 升一 細辛 枳實 兩二 杏仁 兩三 右九味切以水九升煮取三升去滓分

三服忌羊肉錫生菜等物

又療上焦熱牽肘掌心痛喘欬短氣動而好唾潤肺止心痛大棗湯方 大棗 兩三十 杏仁 兩六 升 人參 兩三

紫莞 兩二 姜糖 麥門冬 兩五 通草 兩三 石膏 兩八 五味子 兩一 羊腎 兩三 散麻黃 兩三 右十二味切以

水一斗煮取二升五合去滓下蜜三合生薑汁三合淡竹瀝三合更上火煎取三升分三服

又療上焦虛寒精神不守泄下便利語聲不出茯苓安心湯方 茯苓 人參 乾薑 兩三 桂心 兩一 遠志

皮 兩三 甘草 兩二 右六味切以水九升煮取三升去滓分三服忌生蔥醋物海藻菘菜等物

又療上焦虛寒腸鳴下利心下痞堅半夏瀉心湯方 半夏 兩五 黃芩 甘草 兩各一 人參 乾薑 兩各三 黃連

兩一 桂心 兩三 右七味以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜錫羊肉生蔥豬肉冷水 此仲景半

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

仁者四有

八兩下有

碎字一兩

作二兩三

秋下有細

碎二字

洗字下宋

本有四破

二字

共字下宋

本有雙仁

然三字

尚德按十

金匱按十

尚德按十

八合玄參

四兩

以水二升

煮取五升

分爲五服

千金瘡上焦虛寒短氣語聲不出黃耆理中湯方

黃耆

桂心

二升

參

桔梗

乾薑

子

茯苓

甘草

三兩

杏仁

芎藭

右十味切

以水九升

煮取三升

絞去滓

溫分三服

瘡上焦冷下痢腹內不安食好注下黃連丸方

黃連

乾薑

四兩

枳實

三兩

烏梅

八兩

附子

黃芩

黃柏

阿膠

右九味末之

白蜜和爲丸

如梧子大

飲下二十九

加至三十九

忌猪肉

冷水生蔥等

同煎

人瘡上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸厚朴湯方

厚朴

四兩

吳茱萸

五兩

人參

三兩

茯苓

五兩

白朮

四兩

茯苓

兩

桔梗

三兩

生薑

八兩

玄參

三兩

芎藭

白朮

四兩

三升絞去滓分三服

忌猪肉

桃李雀肉

大醋

同出第

二十卷中

中焦熱及寒洩痢方三首

刪繁論曰

中焦如瀉

起於胃中管在上焦之後此受氣泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉

乃化而爲血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰榮氣主足陽明陽明別號曰豐隆在外踝上去

踝八寸別走太陰絡諸經之脉上下絡太倉主熱五穀不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下隔絕虛

則生寒寒則洞泄便痢霍亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛是精氣榮是神氣故血與氣異形而

同類焉奪血無汗親奪汗無血親故人有一死而無再生也猶精神之氣隔絕也若虛則補於胃實

則寫於脾調其中和其源萬不遺一也

同金

又瘡中焦實熱閉塞上下不通隔絕關格不吐不下腹滿彭彭喘急大黃瀉熱開關格通隔絕湯方

大

黃

三兩

黃芩

三兩

黃芩

澤瀉

升麻

三兩

羚羊角

梔子仁

四兩

生地黃

汁

升玄參

兩

芒硝

三兩

右九味切

以水九升

煮取三升

絞去滓

溫分三服

忌蕪荑

同金

以水七升先煮七味取二升三合下大黃更煎數沸絞去滓下硝分三服忌蕪荑

同金

金德勝千
地膚子
榆白木各
一兩阿膠
五兩

七家本作
十

宋本六兩
下有碎字
地黃下有

宋本香夏
一升下有
煎別裏三
有地黃下
字宋無加

千金瘡中焦熱水穀下痢藍膏丸方 藍膏汁三黃連兩黃柏兩白朮兩地榆兩地膚子兩阿膠五分烏

梅肉兩三 右八味下篩用藍汁和微火上煎為丸如杏仁大飲服三丸日再七月七日合之良當併手

丸之忌豬肉冷水桃李雀肉等

入瘡中焦虛寒四肢不可舉動多汗洞痢方 灸大橫隨年壯大橫使臍傍行相去兩邊各兩寸五分

同出第二 七卷中

下焦熱方六首

刪繁論曰下焦如瀆水決也起胃下管別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀常并居於胃中成糟粕而

俱下於大腸主足陽明灌漑津液合膀胱主出入別於清濁主肝腎之病也若實則大小便不通利

氣逆不續吐嘔不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絕人飲酒亦入胃穀未熟而小便獨先下者

何也蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而先穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎千金

又瘡下焦熱大小便俱不通柴胡通塞湯方 柴胡 黃芩 橘皮 澤瀉兩三 梔子仁兩四 石膏兩六 羚羊

角三兩 生地黃升芒硝兩三 香豉升 右十味切以水一斗煮九味取三升去滓下芒硝分三服忌蕪薹

同金

又瘡下焦熱氣逆不續吐嘔不禁名曰走哺止嘔人參湯方 人參 生蘆根 梔子仁 薤白 黃芩

知母 茯苓兩三 白朮兩四 石膏兩八 橘皮兩四 右十味切以水九升煮取三升去滓分三服忌桃李雀肉

醋等耐金

又瘡走哺不止或嘔噎熱氣衝心滿悶香豉湯方 香豉 生地黃兩一 白朮兩三 甘草兩二 竹葉升一 石膏

兩八 茯苓兩三 蔥白升一 右八味切以水七升煮取二升五合去滓分三服須利下加芒硝三兩忌蕪薹海

藻菰菜李雀肉酢物等

又瘡下焦熱毒痢血如鵝鴨肝不止升麻湯方 升麻 犀角兩各 地榆兩四 絳草兩三 荷根兩四 黃芩兩三

二十枚下
宋本有去
核二字

高德按千
金以水九
升煮取二

枚字下宋
本有熱令
黃去虎共
六字
柳本千金
柳本千金
高德按千
金無柳有
地榆三兩

下焦虛寒方六首

芭蕉根升切一桔梗雨三梔子仁枚七右九物切以水九升煮取三升去滓分三服忌猪肉卷第四

千金療下焦熱或痢下膿血煩悶恍惚赤石脂湯方 赤石脂雨八烏梅肉枚十梔子仁枚十四白朮雨三乾薑

雨二廩米升一升麻雨三右七味切以水一斗煮米取熟去米取七升下諸藥煮取二升五合去滓分三服

忌桃李雀肉等同紫

又療下焦熱毒痢魚腦雜痢鮮血臍下少腹絞痛不可忍欲痢不出香豉湯方 香豉升梔子雨四薤白升一

黃連雨各三黃柏雨各三地榆雨各四白朮雨各三蒿根雨各三右九味切以水一斗煮取三升分三服忌猪

肉冷水桃李雀肉等刪紫同出第

下焦虛寒方六首

刪繁療下焦虛寒大便洞泄不止柏皮湯止痢方 黃柏雨三黃連雨五人參雨三茯苓雨四厚朴雨四艾葉升一地

榆雨三檉皮雨四阿膠雨三右九味切以水一斗煮取三升去滓下膠煎取二升分三服忌猪肉冷水

醋等雨全

又療下焦虛寒津液不止氣欲絕人參續氣湯方 人參雨橘皮升茯苓雨烏梅皮升麥門冬升黃耆升

芍藥雨乾薑雨三白朮雨厚朴雨四桂心雨二吳茱萸升右十二味切以水一斗二升煮取三升去滓

分三服忌桃李雀肉生蔥醋物雨全

又療下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞而短氣茯苓丸方 茯苓升甘草升芍藥升

仁枚五十人參升厚朴升乾薑升黃耆升桂心升當歸升芍藥升乾地黃升右十一味搗篩下蜜和

為丸如梧子初服二十九加至三十九日再服清白飲進之忌海藻松菜生葱酢物薑蕒等

又療下焦虛寒損或先見血後便轉此為近血或利不利伏龍肝湯方 伏龍肝升甘草升乾薑升黃

柏雨五黃芩升牛膝根升柳雨二燒頭髮屑升阿膠雨二右九味切以水七升煮取三升去滓下阿膠

更煎取膠烊下髮屑分三服忌海藻菰菜雨全并雨全同出第四卷中

尚德桂止
 利千金作
 入按千金
 精斷富歸
 桂心蒲黃
 阿膠各一
 尚德桂干
 金乾薑乾
 地黃柏三
 皮各三兩
 青竹茹半
 升伏龍肝
 一升
 宋本蜜字
 下有堪字
 九字下有
 出之二字
 三九下有
 丸字

千金療下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利下或不利好因勞冷而發續斷止利湯方
續斷

當歸各三乾薑四蒲黃各三桂心甘草各二乾地黃四阿膠二右八味以水九升煮六味取三升五

合去滓下阿膠更煎取膠烱盡下蒲黃分三服忌海藻菰菜生蔥燕薹

又療三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦因起或熱損發或虛寒損發或因勞發或因酒發當歸湯

方當歸三白芍藥四羚羊角三兩伏龍肝一黃芩一乾地黃二白木四青竹皮一柏枝一小薊一阿

膠三兩乾薑甘草各二蒲黃各五亂髮一燒灰一右十五味切以水一斗二升煮十二味

取三升五合去滓下阿膠煎取膠烱下髮灰蒲黃分三服忌海藻菰菜燕薹桃李雀肉等

許仁則療霍亂方三首

許仁則云此病有兩種一名乾霍一名濕霍乾霍死者多濕霍死者少俱錄飲食不節將息失宜乾霍之

狀心腹脹滿攪刺疼痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不通求吐不出求利不下須臾不

救便有性命之慮濕霍之狀心腹亦攪痛諸候有與乾同但吐痢無限此病始得有與天行相似者亦令

頭痛骨肉酸楚手足逆冷四體發熱乾霍大小便不通煩冤欲死宜與巴豆等三味丸服之服取快利

方巴豆一百粒乾薑五兩代與千金同大黃五兩右藥先搗乾薑大黃為散後別搗巴豆如膏和前

二味同搗令調細細下蜜丸以飲下初服三丸如梧子大服訖數按肚令轉動速下利良久不覺則以

熱飲投之又良久不利更服一丸須臾當利後好將息食飲寒溫以意取適如渴者煮漿水粥少少

啖之忌野猪肉蘆筍等物仲文

又療濕霍亂吐痢無限宜合高良薑等三味飲子服之方高良薑二豆蔻子二桂心二右藥切以

水四升煮取一升去滓細細啖之亦有於此方加乾薑人參二物忌生蔥

又木瓜桂心二物飲之方木瓜一枚桂心二右藥以水二升煮取七合去滓細細飲之亦有豆蔻

子代桂心者亦有單煮木瓜汁飲之忌生蔥第一卷中

雜療霍亂方四首

小品瘡霍亂嘔呃氣厥不得喘息鼓湯方

鼓半半夏一兩

生薑二兩

柴胡

甘草

各一兩

右六味

切以水五升煮取二升半溫服七合忌羊肉錫海藻菰菜等

心一金有桂

人療卒道中得霍亂無有方藥氣息危急醫視捨去皆云必死療之方

薤蓮農一大把煮令味濃頓服

二升則差已用有效食中魚蟹毒者服之尤良

薤蓮農一大把煮令味濃頓服

冊繁瘡霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止桔梗湯方

桔梗四兩

白朮五兩

乾薑

茯苓

各三兩

倉米

升

右五物

切以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升絞去滓分服忌桃李雀肉猪肉大酢

近效訶梨勒散療一切風氣痰冷霍亂食不消大便澀方

取訶梨勒三顆擣取皮和酒頓服三五度則

差

乾嘔方六首

病源乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔也

出第二十卷中

廣濟療卒乾嘔不怠方

破雞子去白吞中黃數枚則愈

附文仲同

又方 生葛根絞取汁服一升

又方 甘蔗汁溫令熱服一升日三服

同並出第三卷中

集驗療病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

同并金

又療吐逆乾嘔生薑湯方

生薑四兩澤瀉三兩桂心二兩橘皮三兩甘草二兩茯苓四兩

右八味切

以水七升煮取三升服五合日三忌海藻菰菜醋物生葱

並出第四卷中

崔氏療患嘔人參湯方

人參兩胡麻仁八合內橘皮兩二枚枳葉半斤

試

葉取五升汁內人參等三種煎取三升稍稍飲之

徐王張文仲并金

嘔噦方四首

卷字下宋
本有中字

尚德按肘
後裁字下
有去字無
蜜字

病源嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不消所為也胃受邪氣逆則嘔脾受邪脾脹氣逆遇冷折之氣逆不通則噦也出第二十一卷

廣濟療嘔噦不止橘皮湯方 橘皮升生薑兩甘草二兩枇杷葉四兩蜜炙炙右四味切以水五升煮取二

升五合絞去滓分溫三服每服相去如人行六七里忌海藻菰菜卷中第一

肘後療嘔噦方 生薑莫藤斷之當汁出器承取飲一升生葛藤尤佳卷中第一

又方 枇杷葉一斤拭毛蜜炙水一斗煮取三升分再服備急同出

必效療嘔噦方 取蘆根五兩切以水五升煮取三升頓服兼以童子小便一兩合不過三服則差出第二卷中

噦方七首

病源脾胃俱虛受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹脾脹則氣逆因遇冷折之則噦也右手關上脉沉而虛者病善噦也出第二十卷中

肘後療卒噦不止方 痛抓眉中央閉氣也

又方 以物刺鼻中若以少許皂莢屑內鼻中令嚏則差

又方 但閉氣抑引之

又方 好豉二升煮取汁服之肝全

又方 染米粉二升并華水服之並出第三卷中

集驗療卒噦方 枳實三枚炙去核咬咀之以三家乳一升以羊脂五兩煎枳實令沸復內乳令沸去滓

含咽之韞六卷中

張文仲陶氏噦方 飲新汲井水數升佳肘後備急千金同出第六卷中

嘔逆吐方八首

兩德接隔
要略作隔

洗字下宋
本有瀉完
用三字
酢字下宋
本有物字

或字下宋
本有則字
作二字
本

病源嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所為也若風邪在胃則嘔隔間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其
狀長太息心裏澹澹然或煩滿而大便難或澹泄並其候養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發寒
熱及溫病食欲吐或心中停飲不消或為反胃其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引
法云正坐兩手向後捉腕反向拓席盡勢使腹弦強上下七左右換手亦然除腹肚冷風宿氣或胃口冷
食飲進退吐逆不下入云偃卧展兩脛兩手左右蹻兩足踵以鼻內氣自極七息除腹中病食苦嘔又云
坐直舒兩足以兩手挽兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直入兩腳底兩腳痛舒以頭抵
膝上自極十二通愈腸胃不能受食吐逆一卷第二十

仲景傷寒論嘔吐病在隔上後必思水者急與之思水與猪苓散方 猪苓去茯苓 白朮 右三味各
等分搗篩飲汁和服方寸匕日三服欲飲水者極與之本虛與水則噦攻其熱亦噦忌桃李雀肉醋物

千金同出第
十六卷中

必效小麥湯主嘔吐不止方 小麥一升 人參兩四 青竹茹二兩 茯苓三兩 厚朴四兩 甘草一兩 生薑汁三

右七味以水八升煮取三升分三服忌海藻菰菜酢金

又凡服湯嘔逆不入腹者方 先單煮炙甘草三小兩以水三升煮取二升服之得吐但更服不吐益好

消息定然後服餘湯則流利更不吐也忌海藻菰菜千金同並出

延年人參飲主吐方 人參一兩 橘皮三兩 生薑二兩 右三味切以水四升煮取一升五合分溫三服出第六

又麥門冬飲主風邪熱氣衝心心悶短氣吐不下食方 麥門冬二兩 人參 橘皮各一兩 生薑三兩 羚羊角

屑一兩 右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三服

又甘草飲主脾腎冷氣乘心痛悶吐利四肢逆冷或煩疼方 甘草炙 人參各二兩 乾薑四兩 厚朴炙 白朮各

二 右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三四服如人行八九里忌海藻菰菜桃李雀肉等

出第六
卷中

嘔逆不下食方八首

備急療吐逆水米不下乾薑甘草湯方

乾薑二分甘草一分

右二味切以水二合煎取一合去滓頓

服則定少間與粥則不嘔神驗

忌海藻菘菜

張文仲同出第三卷中

延年人參飲主嘔不能食方

人參分厚朴吳橘皮各六分

白朮生薑各八

右五味切以水四大升煮

取一升五合分溫三服忌桃李雀肉等

許仁則療嘔吐方四首第六卷中

許仁則療嘔吐方四首

許仁則療嘔吐病有兩種一者積熱在胃嘔逆不下食一者積冷在胃亦嘔逆不下食二事正反須細察

之必其食飲寢處將息傷熱又素無冷病年壯力強膚肉充滿此則是積熱在胃致此嘔逆如將息食飲

寢處不熱又素有冷病年衰力弱膚肉瘦悴此則積冷在胃生此嘔逆若是積冷嘔逆經久急須救之不

爾甚成反胃病積熱在胃嘔逆不下食宜合生薑根五味飲服方

生薑汁五合茯苓兩五右藥切以水八升煮取二升半去滓加竹瀝六分合攪調分三服相去如人行十

里久始服一劑忌醋物

又依前生薑根等五味飲服之雖可然未能全除者宜合茯苓等五味丸服之方

茯苓兩五人參兩三麥門冬一升生薑兩六青竹茹升

冬一升生薑兩六青竹茹升

右藥搗篩蜜和為丸煎蘆根飲下之初服十五丸日二服稍稍加至三

十九丸如梧子大忌醋物

又積冷在胃嘔逆不下食宜合半夏等二味丸服之方

半夏製小麥麴各一

右搗半夏為散以水浸

麴丸如彈子大以水煮令麴熟則是藥成初吞四五丸日二服稍稍加至十四五丸旋煮旋服服此覺

病減欲更重合服亦佳忌羊肉錫

散忌

又依前半夏等二味丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸又慮毒藥不可久服欲不服藥又恐病滋蔓

宜合人參等七味丸服之方

人參白朮

各五兩

生薑屑

厚朴

各四兩

細辛

橘皮

各二兩

右藥搗

篩為末蜜和為丸如梧子飲下之初服十九丸日二服稍稍加至二十九丸欲與前半夏丸間服亦得忌桃

劑宋下宋本有得可欲重合服亦佳八字

半夏一升下宋本云真能州者洗去滑

李雀肉生蔥生菜吳昇同並出第一卷中

雜療嘔吐噦方三首

仲景傷寒論夫嘔家有癰膿者不可療也其嘔膿盡自愈若先嘔後渴者為欲解也先渴後嘔者為水停
在心下此屬飲家

嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲張仲景方此證當用小夏加茯苓湯方在支飲門

嘔脈弱小便復利身有微熱見厥者難療四逆湯主之方 甘草炙兩 附子一枚 乾薑一兩 右三物呖咀

以水三升煮取一升二合去滓溫分再服強人用大附子一枚乾薑三兩忌海藻菘菜豬肉

又嘔心下痞堅者大半夏湯主之方 半夏洗三升 人參切三兩 白蜜升 右三味以泉水一斗二升并蜜和

揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升日再服忌羊肉鴿本論治反 乾薑三兩 右六味切以水

又乾嘔下利黃芩湯主之方 黃芩 人參各三兩 桂心二兩 大棗枚二 半夏洗半升 乾薑三兩 右六味切以水

七升煮取三升溫分三服忌羊肉鴿生蔥出第廿六卷中

噫醋方七首

病源噫醋者由上焦有停痰脾胃有宿冷故不能消穀穀不消脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣息酸臭

也出第廿一卷中

廣濟療吐酸水每食則變作醋水吐虫檳榔散方 檳榔分六 人參分茯苓分橘皮 華撥分六 右五

味搗篩為散平晨空腹取生薑五大兩合皮搗絞取汁溫內散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一

已半若利多減以微通洩為度忌酢物生冷油膩猪魚等

又療常吐酸水脾胃中冷茯苓湯方 茯苓 橘皮各分白朮分人參 桂心分六 甘草分八 紫蘇錢生

薑分二 檳榔枚 右九味切以水九升煮取二升半絞去滓分溫三服每服如人行七八里未好差三

兩日更服一劑老小取微利忌生蔥酢物桃李雀肉海藻菘菜

枚字下宋
本有合皮
子碎四字

柳字下宋
本有八字

尚德按三
升要略作
二升
洗字下宋
本有全用
二字

枚字下宋
本有破八
片三字

柳字下宋
本有人字

久字下宋
本有或中
間食時後
能服一劑
銷痰破冷
十四字
共字下宋
本有熱令
紫色別持
作脂八字
當宋本作

久療嘔吐酸水結氣築心白木散方 白木 茯苓^{銘八} 吳茱萸^{分四} 橘皮^{分華} 枳^{分厚} 朴^{分八} 橘柳^{分八} 人

參^{分大} 黃^分 右九味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕日二服漸加至二匕半覺熱服少飲食三

兩口壓之忌酢物桃李雀肉等

又療心頭結氣連胸背痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方 茯苓 厚朴^{各四} 橘皮^各 白木^{各二} 生薑^{各十}

右五味切以水九升煮取二升七合絞去滓分溫三服每服相去如人行七八里須利加橘柳末一兩

半湯欲熟時內之甚安穩三日服一劑頻服五六劑可則停忌酢物桃李雀肉等^{各二} 兩^{並出} 第一卷

延年療食訛醋咽多噫吳茱萸湯方 吳茱萸^{合五} 生薑^{兩三} 人參^{兩二} 大棗^{枚十二} 右四味切以水六升煮取

二升絞去滓分為三服每服相去十里久^{金並同} 時後^{分兩} 喘急^十

又增損承氣丸療胸脅支滿背上時有一答熱則痛腹脹多噫醋咽氣逆兩脅滿並主之方 前胡 枳

實^{各七} 桂心 乾薑 吳茱萸^{各五} 茯苓^{分四} 芍藥^{分六} 厚朴^{分六} 橘皮^{各十} 大黃^{分六} 杏仁^{去皮共} 右十一

味搗篩為末內杏仁脂中研調篩度蜜和丸每服食後少時酒飲任性初服七丸如梧子以氣宣下洩

為度忌生葱大醋^{並出第十}

必效理中散主食後吐酸水食羹粥酪劇方 乾薑 食茱萸^{各二} 右二味作散酒服方寸匕日三溫

服勿冷服之常醋水差^{新金同出}

尚德按今
有方七首
尚德按今
有方一十
七首

尚德按今
有方一十
二首

唐王燾先生外臺祕要方卷七日錄心痛心腹痛及

寒疝三十二門

心痛方八首

諸蟲心痛方一十八首

惡症心痛方三首

心背微痛方四首

中惡心痛方五首

心下懸急懊痛方四首

久心痛方六首

腹痛方四首

心腹痛及脹滿痛方一十首

卒心腹脹滿方六首

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

胸脇痛及妨悶方四首

胸膈氣方三首

寒症心痛方三首

七疝方三首

寒疝積聚方四首

九種心痛方三首

冷氣心痛方五首

心痛癢魂方二首

卒心痛方一十四首

多唾停飲心痛方二首

心痛不能飲食方二首

雜療心痛方三首

卒腹痛方七首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

腹脹雷鳴方三首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

脇肋痛方二首

寒疝腹痛方九首

卒疝方三首

寒症不能食方四首

心疝方四首

唐王壽先生外臺祕要方卷七

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

門姪林雲來父全校

尚德接令
有方七首

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死

又心為火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰為脾之經與胃合引足陽明為胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收持苦泄寒中為腎心痛也

診其心脉急者為心痛引背食不下

寸口脉沉緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沉則為陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛

出第十卷中

備急療心痛方 桂心末溫酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服之亦佳忌生葱

文仲藥驗時後同出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方 吳茱萸半兩 乾薑半兩 桂心兩 白朮兩 人參兩 橘皮兩 附子半兩 蜀椒出 汗甘

草一兩 黃芩一兩 當歸兩 右十一味搗篩為散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至十五丸忌猪

肉生蔥海藻菰菜桃李雀肉等盡更合酒飲無拘食前後任意肝後有桔梗一兩出第十五卷中

救急療心痛方 取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差肝後同出第八卷中

又方 東引桃枝一握切以酒一升煮取半升頓服大效肝後同出第八卷中

必效療心痛方 當歸末酒服方寸匕頻服肝後同出第八卷中

又方 生油半合溫服差肝後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方 黃連肝後同 右一物吹咀以水七升煮取一升五合緩去滓適寒溫飲五合日三服忌猪肉冷水肝後同

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胸背撮痛欲變吐當歸鶴蝨散方 當歸 鶴蝨各八 橘皮 人參各六 檳榔分二 枳實吳芎藥分各六 桂心分五 右八味搗篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服漸加至一匕半不利忘生蔥生冷物油膩粘食出第四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛悉主之并療冷衝上氣落馬墮車附子丸方 附子炮一兩 已豆仁一兩去心皮 人參一兩 生狼毒一分 令極食茱萸而乾薑而右六味搗末蜜和空腹服如梧子三九一日一服弱者二九卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胸痛者亦服之好好將息神效忌野猪肉蘆笋心錄同

又療九種心痛方 取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一升頓服之並出第十卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蝨散方 當歸 桔梗 芎藥 橘皮 鶴蝨各八 人參各六 桂心各六 檳榔分二 右八味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加至二匕不利忌猪肉生蔥油膩小豆粘食等

高德按千金附子乾薑各二兩生狼毒四分而食茱萸作藥亦小異有方一十人首

又療蛔蟲心痛積年久不差方 取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢瀉著酒中頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方 當歸 橘皮 細辛 甘草炙生薑各四 大黃八分

鶴蝮分 右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之

忌海藻 菰菜生菜 取急同出 第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面自青肉冷汗出欲霍亂吐下脉沉細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也 當歸 人參 乾薑 茯苓 厚

朴炙青木香 桂心 桔梗 芍藥 甘草炙各 右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服

不耐青木香者以犀角一兩代之忌海藻菰菜豬肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜癢癢如物從後觸其心身偃僕者腎心痛也

厥心痛腹脹滿不欲食食則不消心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛如錐鍼刺其心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死反狀不得太息者肝心痛也 千金

厥心痛臥若徒居痛間動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎出是蛭蟲咬也 壯甲乙經 第一卷中

千金療心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蛭蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑

後若不效有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方中此是增損湯方 芍藥 黃芩 厚朴 桔梗 柴胡 各四 當歸 升麻 各三 右七味切以水八升煮取二升半分三服忌豬肉 出第十卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蝮散方 鶴蝮二分末溫酢一盞和服之蟲當出 備急千金同

尚德接十
金為藥四
兩厚朴作

高橋按
疑當作
漢

乾漆丸方

乾漆熬持蜜和丸服十五丸日再服急

冷氣心痛方五首

二

又方

取槐上木耳燒反末如棗大正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲立出必效方云酒下同急

又方

發時取鹽一匙內口中水下立定蟲即出第一卷中

延年療蛔蟲惡吐水心痛鶴蟲丸方

鶴蟲三兩持篩蜜和為丸用蜜漿水平旦服二十九日只一服

經驗用十兩云其雲惡心
痛十年不差令服此便愈

又鶴蟲丸療蛔蟲心痛方

鶴蟲六兩吳茱萸五兩橘皮四兩桂心三兩檳榔四兩右五味持篩蜜和為丸如梧子

大一服二十九蜜湯下日二服加至三十九丸以蟲出為度忌生葱五卷中

救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方

生真胡麻合胡粉餅粉右二味先以豬肉脯一片空腹喫

汁勿喫肉後取胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟酌增減忌生冷豬肉魚雞蒜

酢滑等七日若是蛔吐水者是也

必效療蛔心痛方

蓋痛一處若小蟲咬也取鰻鱺魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食彌佳

又方熊膽如大豆和水服大效

又茱萸丸方

吳茱萸一桂心二當歸二右三味持篩蜜和丸如梧子酒服三十九日再服漸加至四

十丸以知為度忌生葱

又丁香散方

丁香散頭髮灰許一囊右二味並末和酒服之

又鶴蟲橘柳湯方

鶴蟲用一兩小兒檳榔二七右二味以豬肉汁六升煮檳榔取三升去滓內鶴蟲末

先夜不食明旦空腹頓服之須臾病下及吐水永差神效七日禁生冷酢五卷中

冷氣心痛方五首

廣濟主冷氣心痛肋下鳴轉喉中妨食不消常生食氣每食心頭住不下桔梗散方

桔梗當歸芍

藥茯苓橘皮厚朴炙白朮各八華撥分豈薏子分檳榔分桂心分訶梨勒皮分右十二味

搗篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服加至一匕半不利忌生葱豬肉酢物桃李雀肉等一方有

周結梗出
第四卷中

深師療胸滿短氣心痛吐涎虛冷防風茯苓湯方 防風 茯苓各二 桂心各二 甘草各二 半夏各二 乾薑各二

四雨 人參各三 右七味切以水一斗煮三升絞去滓分三服良忌酢物生蔥海藻菜羊肉出第十卷中

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方 烏頭地 附子地 赤石脂各三 蜀椒出二 桂心 乾薑各二

右六物搗篩蜜和為丸痛發時溫清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知為

度若早朝服無所覺至午時又服三丸此方丹陽有隱士出山云得華陀法其療略同若久心痛每旦

服三丸稍加至十九盡一劑遂終身不發忌生葱豬肉出張文仲備急中第四卷中

延年療冷氣久刺心痛不能食方 當歸 桂心 桔梗 吳茱萸 人參 白朮 高良薑以上各橘

皮各三 右八味搗篩為散蜜和為丸如梧子大一服十九酒下日二服加至十五二十九為度忌生葱

桃李豬肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲嚙心痛當歸湯方 當歸各三 桔梗各二 吳茱萸 桂心各三 芍藥 大

黃各二 右六味切以水六升煮取三升三合去滓內鵝卵一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利為

度忌豬肉生葱出第十卷中

惡症心痛方三首

廣濟療惡症撮肋連心痛當歸湯方 當歸各三 青木香各二 橘榔各二 麝香一錢 右四味切以小便一大

升半煮取六六合絞去滓下麝香末分溫三服服別如人行四五里進一服微微利忌生菜麵猪犬肉

粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療症在心腹痛不可忍方 取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡

則差如不定更依前服之無忌

心痛癰塊方二首 心背微痛方四首

久療心腹痛不可忍似症病者或暴得惡症覺刺欲死桃仁大黃湯方 鬼箭羽二兩 桃仁六十枚 芍藥四兩

鬼臼二兩 橘皮 當歸各二兩 生薑五兩 桂心 柴胡各二兩 砂礞石二兩 腐香湯成下 朴硝二兩 大黃二兩

別浸 右十三味切以水九升急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必

差忌生蔥生血物並出第四卷中

心痛癰塊方二首

廣濟療心痛癰塊硬築心氣欲絕當歸湯方 當歸 桔梗 芍藥各八兩 朴射分 橘皮八兩 人參六兩 高良

薑針桃仁五十枚 生薑八兩 右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去如人行六

七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食小豆大蒜此第四卷中 枳實七枚 白木三兩 右二味切以水

一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也忌桃李雀肉等此張仲景傷寒論方備急胎後同出第一卷中

心背微痛方四首

仲景傷寒論心痛微背背痛微心烏頭赤石脂丸主之方 烏頭二分 炮附子一分 炮赤石脂二分 乾薑二分

蜀椒汗一分 右五味搗蜀椒和丸先食服如麻子大一服三九少少加之忌猪肉冷水此金匱心經文仲等

同出第十五卷中 千金分兩小別

張文仲蜀椒丸療胸中氣滿心痛引背方 蜀椒一升 半夏一升 附子一兩 右三味搗蜀椒和為丸如

梧子大一服五九日三忌猪羊肉錫等此第三卷中 芩薢黃升蜀椒五兩 甘草二兩 乾地黄一斤 右

芩汪療心下切痛引背胸下蓄氣胃中有宿食萊萸煎方 芩薢黃升蜀椒五兩 甘草二兩 乾地黄一斤 右

四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬五升去心乾漆一斤內煎中色黃絞去之內

石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服勝

脛重痛者加石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下癥忌海藻菰菜蕪荑等此仲景方中

尚德按要略分兩與此不同服法亦小異

尚德按肘
雨後桂心二
尚德按肘
雨後桂心三
大按肘後
煮取二升

又芫花湯主卒心痛連背背痛微心小腹並懊痛如鬼所刺絞急欲死者方 芫花針大黃針 右二味

搗下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈老少從少起此療

強實人良若虛冷心痛恐未可服

並出第十卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方 先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用鹽水或半升服之

同錄

又方 吳茱萸升二生薑切四兩豉升酒升 右四味煮取二升半分三服

又方 白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物出

范注

又方 取竈下熱灰篩去炭分以布囊盛令灼灼爾更番以熨痛上冷者更熱令熱

又桂心散方 桂心 當歸各一兩 梔子仁枚十四 右三味搗為散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發

作有時節者忌生蔥

又桂心丸方 桂心雨烏頭地一兩 右二味搗篩蜜和為丸如梧子服三丸稍增之忌生蔥豬肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方 苦參 龍膽 升麻各二兩 梔子仁三枚 右四味切苦酒五升煮取一升

分二服當大吐乃差

並出第十卷中

集驗卒心痛桂心湯方 桂心八兩 右一味以水四升煮取一升半分二服忌生蔥

肘後范注千金同出第一卷中

張文仲療卒心痛方 取敗布裏鹽如彈子燒令赤末以酒一杯和服之

肘後備急同出第五卷中

又方 閉氣忍之數十過并以手大指按心下宛宛中取差

肘後備急同

又方 苦酒一升破雞子一枚著中合攪飲之好酒亦佳

肘後備急同並出第十卷中

又方 蒸大豆 煮之以覆更番熨心上冷復易之

肘後備急同並出第十卷中

救急療卒心痛不能起止方 升華水升二大蜜合半 右二味相和婦人患令男子度與飲男子患令婦人

度與飲必愈

中卷第八

必效療卒心痛人參湯方 人參 桂心 梔子 黃芩 甘草 各一兩 右五味切以水六升煮取二升

分三服則愈奇效忌海藻菰菜生葱 肘後同出 第五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絕瓜蒂散方 雄黃 四兩 赤小豆 四分 瓜蒂 三分 右三味擣

篩為散空肚溫漿水服一錢匕半當吐止不吐加至兩錢匕忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方 麝香 一分 生犀角 二分 青木香 一分 右三味擣篩為散空肚

以熟水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛 並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方 大黃 芍藥 各四兩 升麻 黃芩 鬼箭 各三兩 鬼白 桂心

各二兩 桔梗 三兩 柴胡 四兩 硃砂 二兩 朴硝 二兩 右十一味切以水九升煮取二升七合分三服先分硃砂作

三分一服內一分攪硃砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌猪肉生葱生血物 千金云寒氣卒客於五臟六腑

中則發心痛 方千金同

又方 赤芍藥 六兩 桔梗 五兩 杏仁 五兩 去 皮 右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌肉猪 千金同 出第一

中卷

千金療卒中惡心痛方 苦參 三兩 好醋 一升 右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服 世第三

中卷

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所為也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸心之腑也其水氣下行於小腸為澁便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱為腎之腑主藏津液腎之液上為唾腎氣下通於陰若腑臟和平則水液下流宣利若冷熱相乘致腑臟不調津液水飲停積

南德按
源作壘

尚德按
要

略云心
中

悲諸逆
心

生薑桂
枝

湯主之

尚德按
切音

於藏切
音

高德按
下

千金作
中

又按四
千

金作六

上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也

出第十卷中

范汪療胸中寒熱心痛清唾滿口數欲吐食不化乾薑九方 乾薑 桂心各一分 礬石一分 半夏

蜀椒各一

右五味搗篩蜜和丸如大豆許服二九日三不知稍加以知為度忌生蔥羊肉錫出第十卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方 取六畜心隨得生切作四瓣刀縱橫各一割破之內少真硃砂著中平旦

吞之蟲死愈矣無真硃砂可用雄黃麝香也

通按生食果安石

附後云切作十四瓣刀縱橫各割之以真丹一兩粉內割中旦吞之入雄黃麝香佳時後經心經同出第一卷中

心下懸急懊痛方四首

病源心與小腸合為表裏俱象於火而火為陽氣也心為諸藏主故正經不受邪若為邪所傷而痛則死

若支別絡為風邪所乘而痛則經久成疹其痛懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢擁瘀生熱故心如懸

而急煩懊痛也

出第十卷中

仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂心生薑枳實湯主之方 桂心 生薑各三兩 枳實五枚 右三味

切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌生蔥

范注同出十五卷中

右三味

肘後薑附丸方 附子二兩 乾薑一兩 右二味搗篩蜜和丸如梧子服四九酒飲並得日三服忌猪肉冷

水本方云治心胸傷動

乾薑一兩

右二味搗篩蜜和丸如梧子服四九酒飲並得日三服忌猪肉冷

古今錄驗療人心痛懊懷悶悶築築引兩乳又或如刺困極桂心湯方

三當歸二生薑

半斤無生薑以乾薑五兩代之

右五味切以水一斗二升煮取四升服一升晝三夜一良有驗忌生

蔥出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方 桂心二兩 膠飴半斤 生薑二兩 右藥切以水四升煮二味取三

升去滓內飴分三服忌生蔥

出第十卷中

桂心二兩 膠飴半斤 生薑二兩 右藥切以水四升煮二味取三

心痛不能飲食方二首

心下懸急懊痛方四首 心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在內客於脾而乘心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心為大脾為土是母子也俱為邪所乘故痛復不能飲食也出第十卷中

廣濟療久心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方 高良薑 當歸各十 橘皮八 厚朴八 枳梗八 桃仁八

五十枚 吳茱萸 生薑各八 訶梨勒各五 右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服服別

相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食小豆等出第四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方 烏頭六分 椒六分 乾薑四 桂心四 右四味搗末蜜

丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱出第一卷中

久心痛方六首

病源心為諸藏主其中經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展療其人心痛者是心之支

別絡為風邪冷氣所乘痛也故成疹不死發作有時經久不差也出第十卷中

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴蝨散方 雷丸 鶴蝨 貫眾 狼牙 桂心 當歸

檳榔各八 右七味搗篩為散空腹煮蜜水半雞子許服方寸匕日二服若重不過三服則差不利忌

生葱生冷油膩豬魚小豆大蒜等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方 赤石脂 乾薑 桂心 椒 汗 烏頭各 右五味等分末之蜜和丸

如梧子服三丸日三以知為度赤石脂當取坵坵赤中者忌豬肉冷水生葱出第十卷中

必效療三十年心痛方 桃仁七枚 右一味研湯水合頓服酒服亦良出第五卷中

古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發其則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄

立言為處犀角丸服之數日則差方 犀角二分 麝香二分 硃砂四分 桔梗二分 莽草二分 鬼臼二分 附子

二分 桂心二分 貝齒五分 甘草六分 芫花二分 巴豆二十枚 赤足蜈蚣二枚 右十三味搗篩蜜和丸如梧

尚德按人
病源作久

尚德按又
字疑衍

尚德按又
疑當作又

尚德按又
疑當作又
當作柱疑

子飲服一丸旦漸加至三丸以利為度忌生葱猪肉野豬肉蘆笋生血物一方無附子千金有雄黃二分出第八卷中
療心痛如蟲噬痛宛轉欲死不救方 又環搗地黃汁和麴作冷淘不用鹽服一頓蟲即出不出再服必
出便差正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸以來狀如
蝦蟇無目足微似有口蓋被此物所蝕抗云往年見親表患心痛因偶食地黃飢飽遂吐一蟲猶動其
時亦不謂地黃冷淘能害此蟲因盛於小竹筒以數莖地黃冷淘投於竹筒中須臾視之已化為水然
覺此冷淘殺蟲心痛無不永絕抗自得此方救三四人皆如神效出手抄方
經心錄療四十年心痛不差方 黍米瀝汁溫服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入桃仁丸方 桃仁八分去當歸分芍藥分訶梨

勒六分甘草六分延胡索四人參分欖榔枚十右八味搗篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十九丸漸加至

三十九丸日再服取快利忌海藻茹菜生菜薤蕎麥猪犬肉粘食出第四卷中

古今錄驗真心痛證手足青至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死療心痛痛及已死方 高其枕柱其膝

欲令腹皮臃柔爪其臍上三寸胃管有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差緩者止出第八卷中

救急療心痛冷熱方 取伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒和服差出第八卷中

腹痛方四首

病源腹痛者由腑藏虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣

搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脉沉而緊則腹痛尺脉緊

臍下痛脉沉遲腹痛脉來觸觸者少腹痛脉陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有病其脉當沉若細而反浮

大故當愈矣其人不即愈者必當死以其病與脉相反故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

雜療心痛方三首 腹痛方四首

尚德按服
字上病源
有治字

尚德按黃
湯字下疑脫

尚德按十
金吳菜黃
二升餘與
小品同疑

尚德按注
時後作往

外臺方要

卒腹痛方七首

養生方導引法云股肘手臂痛法屈一脰臂中所痛者正偃卧口鼻開氣腹痛以意推之想氣往至痛上
俱熱即愈又云偃卧展兩脰兩手仰足指以鼻內氣自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口內氣鼻出
之除裏急飽咽氣數十令溫中寒乾吐嘔腹痛口內氣七十所大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹
令氣下出第十卷中

張文仲當歸大黃療冷氣牽引腰背肋下腹內痛方 當歸三芍藥八桂心三乾薑六菜菔五人參大

黃略一甘草二兩 右八味切以水六升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菰菜生葱出第三卷中

范黃四味當歸湯主寒腹痛方 當歸 桂心 乾薑略三甘草二兩 右切以水八升煮取三升一服

一升日三服虛冷激痛甚者加黃耆芍藥各二兩忌海藻菰菜生葱出第十五卷中

小品療寒冷腹痛菜菔湯方 吳菜菔二甘草八人參 桂心略一生薑五半夏一小麥升當歸二右

八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌海藻菰菜羊肉錫小葱一千金桂二兩生薑切

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方 芎藭 當歸 桂心 芍藥 甘草一兩黃芩兩乾薑兩杏

仁三十枚 右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻菰菜生葱出第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方 粳米升 右一味以水六升煮取六七沸飲之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差一並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方 令病人卧高枕一尺許柱膝使腹皮踈氣入胸令人爪其臍上三寸便愈能乾咽

吞氣數十過者彌佳亦療心痛肘後備急同

又方 灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急肘後同並

千金療胸腹中卒痛生薑湯方 生薑一斤芍藥八食鹽八醃醃兩四 右三味微火上熱令相得適寒溫服三

合日三出第十卷中

尚德按痛
痛病源作
疔痛

集驗療卒腹痛葛氏方 桂末三匕酒服人參上好乾薑亦佳忌生蔥附後文

又方 食鹽一大把多飲水送取吐附後張文仲同
並出第一卷中

心痛及脹滿痛方一十首

病源心痛者由腑臟虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息診其脉左手寸口人迎以前脉手少陰經也沉者為陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脉細小者生大堅疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾者死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清靜以雞鳴安身臥漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生療心腹痛出第十卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方 桔梗 茯苓各八分枳實各八分厚朴

又芍藥 橘皮各六分桂心五分檳榔八分麥門冬八分 右十味搗篩為散空肚煮薑棗飲服方寸匕日三

服漸加至一匕半熟以茶飲下不利忌豬肉酢物生葱生冷油膩小豆粘食麴炙肉等物

又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方 當歸 茯苓 桔梗 橘皮 高良薑

檳榔 生薑各八分 右七味細切以水七升者取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七

里服訖利三兩行宜停後服忌豬肉酢物生冷油膩魚蒜粘食小豆並出第十卷中

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絕方 梔子十四枚 豉十四枚 右二味以水二升先煮豉取一升二

合去滓內梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之備急文仲同

又方 烏梅二七枚水五升煮一沸內青大錢二七文煮取一升半強人可頓服贏人分再服當下愈仲文

又方 茱萸二兩生薑四兩 豉三合 右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方 狼毒二兩 附子一枚 右二味搗篩蜜和丸服如梧子一日服一九

二日二丸三日三丸自一至三以為常服即差忌猪肉冷水

又方 吳茱萸合乾薑分四附子二分細辛分二人參仁 右五味搗末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日

三忌猪肉生菜等正出第

深師療久寒冷胸膈滿心腹絞痛不能食忽氣吸吸不足前胡湯方 前胡兩半脂仁大棗仁十當歸

茯苓 白朮各一芍藥分桂心兩半夏兩乾薑兩麥門冬分吳茱萸粒百 右十二味切以水八升

煮取三升分三服相去如人行十里進一服忌酢物生葱羊肉鴿桃李雀肉等正出第

小品當歸湯療心腹絞痛諸虛冷氣滿方 當歸兩乾薑兩甘草兩芍藥兩厚朴兩黃耆兩蜀椒兩

汗半夏洗肉桂 人參兩三 右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升羸人服八合大冷者

加附子枝炮忌海藻菰菜羊肉鴿生葱古今錄驗

古今錄驗通命丸療心腹積聚寒中絞痛又心迫滿脅下脹痛方 大黃 遠志去心黃芩 麻黃甞甘草

各已上芒硝兩杏仁六十枚豉仁已豆五十枚去心各四兩 右九味搗合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服

三九日三忌野豬肉蘆葦海藻菰菜出第

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起

於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心藏虛邪氣客於二經與正氣

相搏積聚在兩氣并於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而滑者脹滿也其湯熨針石

別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云伸右脰屈左膝內壓之互息引脾去心腹寒熱胸臆邪

脹依經為之引脾中熱氣出去心腹中寒熱胸臆中邪氣脹滿久行之無熱寒熱時節之所中傷名為真

人之方出第十

廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方 芍藥 當歸 白朮 鼈甲各八分訶黎勒十枚

尚億按慈
病源作有

乾薑 人參各六分 豆蔻 雄雀屎各四分 郁李仁 十分 右十味搗篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下

二十九漸加至三十九日再服不吐不利忌生菜茹葱薤桃李雀肉蒜粘食等物

又療腹脹氣急衝心鞭痛鼈甲丸方 鼈甲炙芍藥 枳實炙人參 檳榔各八訶黎勒 大黃各六桂

心如橘皮分 右九味搗篩為末蜜和為丸空肚以酒服如梧子大二十九漸加至三十九日二服微

利為度忌生葱薤菜炙肉蒜麴等

又療腹脹氣急通草湯方 通草 茯苓 元參 桑白皮 白薇 澤瀉各三人參二郁李仁兩澤漆

葉切一 右九味切以水一斗煮取三升去滓分溫四服服別相去如人行六七里進一服不利忌麵

油膩酢粘食等

又療腹脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者茯苓湯方 茯苓二

防己一兩橘皮 元參各一黃芩 澤瀉各一杏仁去尖皮白朮半一兩大豆半一升郁李仁 桑白皮各二

兩澤漆葉切一猪苓一兩 右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五升去滓澄去下淀

內諸藥煎取二升絞去滓分三服服者加五味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉麵蒜炙肉粘

食油膩等茯苓一云茯苓神

又療患久心痛腹滿并痰飲不下食人參丸方 人參 白朮 枳實各六茯苓分厚朴炙青木香各六

橘皮各六大黃 檳榔各六 右九味搗篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十九日二服漸加至

三十丸不利忌酢物桃李雀肉等

又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方 柴胡 厚朴炙茯苓 橘皮 紫蘇各八生薑分二檳榔五分

右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物

生冷油膩粘食

又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不得郁李仁丸方 郁李仁八牽牛子六分甘遂

高德按乾薑千金作生薑要略又按並疑當作出

熱四防葵鉅菴蘭子 桑白皮 檳榔各四橘皮 澤瀉各二茯苓 澤漆葉各二杏仁各三分 右十

二味搏篩蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服服到十丸微利為度忌酢物生冷油膩麵炙肉蒜等

又療患氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方 紫蘇根訶梨勒皮 當歸 生薑各八人參各八檳榔各八生

地黃汁各一 右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黃汁分溫三服服別如人行四五里溫

進一服利三兩行忌蕪荳生菜麵炙肉魚蒜粘食陳臭等並出第

深師療腹脹滿膨脹逆害飲食熱不得臥流汗厚朴湯方 厚朴各二桂心 芍藥 半夏各三枳實各三 右

甘草二兩麥門冬各四兩黃芩二兩乾薑二兩 右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三小便

難加木三兩人參四兩忌生蔥海藻菰菜羊肉各六 右十

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方 厚朴半斤甘草二兩大黃各三枳實各五桂心二兩乾薑五兩 右切

以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合日三嘔者加半夏五合利者去大黃寒加生薑至半

斤忌海藻菰菜生蔥羊肉各六 右十

集驗療肚滿有氣心腹脹中冷半夏湯方 半夏一升桂心四兩生薑八兩 右三味切以水七升煮取二升

絞去滓適寒溫飲七合忌羊肉各六

古今錄驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆頭痛手足煩疼此方出太醫院藥常用芫花丸

方 芫花一兩大黃 葶藶子各二甘遂 黃芩各二巴豆各四 右七味搏合蜜和丸如

梧子先食服三九日再服一方無硝石忌野豬肉蘆筍等並出第

必效青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方 青木香 檳榔各六大黃各二芍藥 訶梨勒 枳

實各五 右七味搏篩蜜和丸如梧子飲服十五丸漸漸常加以利為度不限丸多少不利者

乃至五十六十九亦得忌生蔥並出第

又療腹脹滿堅如石積年不損者方 取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖則以

絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

並出第二卷中

卒心腹脹滿方六首

肘後療卒心腹煩滿方 劉薏苡根濃煮取汁服三升

又方 黃芩兩杏仁二十枚牡蠣一兩右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方 灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指下一壯愈肘後此方本治卒心逆

此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之例兼宜依霍亂條中法療之人平居有患者亦少皆因他病兼為

之耳或從傷寒後未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或

服藥失度並宜各循其本源為療不得專用此法也

並出第一卷中

備急療卒心腹脹滿又胸脅痛欲死方 熱煮湯令灼灼爾以漬手足冷則易秘之

肘後張文仲同

又桂心散方 枳實炙桂心 右二味等分下篩以米汁服一匕忌生葱

肘後張文仲同並出第一卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方 生薑大有功能遠行宜將自隨煮汁服良患久痢虛損嘔逆不下食見

食則吐取三兩細切搗絞取汁微煖點少多蜜頓服則下食大效

並出第七卷中

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切痛胸脅逆滿附子粳米湯方 附子一枚半夏洗升甘草炙一兩大棗十枚粳米

升 石五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓適寒溫飲一升日三忌海藻菰菜豬

羊肉錫仲景傷寒論同集驗加薑二兩並第十五卷中

延年療患腹內氣脹雷鳴胸背痛方 丹參 枳實炙各桔梗 白朮 芍藥各二生薑四橘柳各右

七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌豬肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等

又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方 丹參 茯苓各三桔梗兩生薑兩細辛 厚朴炙食茱萸各二右

七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如人行七八里忌生葱豬肉酢物

並出第四卷中

尚德按躁肘後作燥

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

唐濟療腹內諸氣脹滿昆布散方

昆布 海藻 人參 元參 橘皮 升麻各三 葛藟 桂心 乾

薑各二 小麥一升半 醋一升半 止

右十味搗篩為散別搗小麥作散合藥散一處更搗千杵酒服方

寸匕日三服漸加至二寸匕不利忌熱麵炙肉生蔥蒜粘食物等

又療冷氣薏苡仁飯粥方

細代薏苡仁炊為飯氣味微勻如麥飯煮粥亦好豉漿粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方

蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著蔥豉薑並得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方

葦蕒搗和食鹽末令調以綿裏如棗大內下部久時或下惡汁并下氣佳

無所忌通按膀胱急妨宜下氣方也

又療氣昆布腫法

高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟摩長三寸闊四五

分仍取蔥白一握二寸切斷摩之更合熟煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依腫法不得令鹹酸

以生薑橘皮椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大效無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

檳榔各三 生薑 青木香各三 橘皮 枳實各二 甘草各二 大黃各二

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服服別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麵

炙肉海藻菰菜等

又療一切氣妨悶不能食檳榔丸方

檳榔各二 芍藥各二 枳實各二 人參各二 大黃各二 青木香各二 桂心各二

右七味搗篩蜜和丸空腹服如梧子二十九日再服漸加至二十五丸微洩為度忌生菜熱麵炙肉蒜

粘食生蔥等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升搗碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加

之以知為度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹為牛尿方

取為牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌

並出第
二卷中

通按雷鳴
酒沸言
氣聲有聲

近效燒鹽通一切氣尤療風方 取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫如打牆鏈許大置

瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰收取鹽搗破如患心腹脹滿

氣隔不通取碁子大含嚥之立差如煮訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病特建用

又訶梨勒丸療氣脹不下食尤除惡氣方 訶梨勒 青木香 石二味等分搗篩融沙糖和眾手一時

捻為丸隨意服之氣甚者每服八十九日再稍輕者每服四五十丸則得性熱者以生牛乳下性冷者

以酒下不問食之前後得云自服大效

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療臌脹脅腹滿法 灸臆俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿水腫法 灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿雷鳴酒沸法 灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半同翼

又療脹滿氣聚寒冷法 灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之同翼

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法 灸中管百壯穴在臍上一寸一名水分同翼

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法 灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針同翼

又療脹滿腎冷瘕聚泄痢法 灸天樞百壯通按人經天樞二穴伏臍二寸翼同

又療冷脹胸滿心腹積聚瘕疼痛法 灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半同翼

又療五藏六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法 灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半並出

又療結氣法 扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名關俞主胸中膈氣灸隨年壯通按關當作厥四椎兩旁一寸半乃厥陰俞也

又主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法 灸太倉穴一名胃募在

心下四寸胃管下一寸灸百壯

胸脅痛及妨悶方四首

又主結氣囊裏針藥所不及法

灸盲募二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下行度頭是灸隨年

壯通按編人臍穴依法量度乃得日月臍募之穴然主

又凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣瘵之法 灸臍下三寸名關元百壯

又瘵短氣不語法 灸肘後兩筋間名天井百壯

又方 灸大椎隨年壯

又方 灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方 灸肝俞第九椎百壯

又方 灸尺澤百壯

又方 灸手十指頭各十壯

又方 灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法 灸鳩尾頭五十壯並出第十卷中

胸脅痛及妨悶方四首

病源胸脅痛者由膽與肝及腎之支脉虛為寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脉從目銳眥貫目下行至胸循脅裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅肋足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注胸中此三經之支脉並循行胸脅邪氣乘於胸脅故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故令胸脅相引而急痛也診其寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為實痛則為急實則為躍弦滑相搏則胸脅搶息痛也

又卒苦煩滿又胸脅痛欲死候此由手少陽之絡脉虛為風邪所乘故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布臚中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胸或下引

於脅故煩滿而又胸脅痛也若經久邪氣留連搏於臑則成積搏於臑則成聚也並出第十卷中

廣濟療氣結等心胸脅悶痛不能喫食訶梨勒散方訶梨勒去枝四顆炮人參仁右二味搗篩為散以牛

乳二升煮三四沸頓服之分為二服亦得如人行三二里進一服無所忌

又療胸脅不利腹中脹氣急妨悶半夏湯方半夏洗一升生薑一斤桂心兩六檳榔末二兩右四味細切以水

八升煮取二升四合絞去滓分溫五服服別相去如人行六七里進一服快利為度忌羊肉鰾生葱油

膩小品有晏菜莢三十顆無檳榔餘並同

又療胸脅妨悶胃中客氣大便苦難大黃九方大黃分十二厚朴炙枳實四分芒硝分八杏仁六分去葶

子四分右六味搗篩蜜和丸空腹以飲服如梧子十九日二服稍稍加以大便微調為度忌生冷油

膩粘食出第二卷中

千金療冷氣脅下往來胸脇痛引脅背悶當歸湯方當歸芍藥吳茱萸桂心人參大黃

甘草兩各二茯苓枳實兩各一乾薑兩三右十味細切以水八升煮取二升半一服八合日三服治尸注

亦佳忌海藻菰菜生葱酢物等出第十卷中

脅肋痛方二首

小品療脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也當以溫藥下之大黃附子湯方大黃兩三附子炮三枚細辛二兩

右三味切以水五升煮取二升分三服若強盛人煮取三升半分為三服服別如人行四五里進一服

忌猪肉冷水生菜等仲景

大半夏茯苓湯療胸脇心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食

此皆胃氣弱受冷故也其脈喜沉弦細遲悉主之方半夏洗生薑兩各五茯苓兩三旋復花兩一陳橘皮人

參桔梗芍藥甘草兩各二桂心兩一右十味切以水九升煮取三升分三服欲得利者加大黃須

微調者用乾地黄病有先時喜水下者加白朮三兩除旋復花若大便不調宜加大黃及乾地黄並用

尚德按三
升要略作
二升

三兩忘羊肉錫酢物生蔥豬肉海藻菰菜集驗同出第一卷中

胸膈氣方三首

廣濟療胸膈氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方 枳實各六犀角

前胡各四青木香 麥門冬各八赤茯苓各八苦參 芍藥各六 右八味搗篩為末蜜和丸如梧子以

飲空腹下二十九丸漸加至三十九丸二服不利忘生菜熱麵油膩炙肉酢蒜

又療胸膈滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方 柴胡 當歸 青木香 犀角各六檳榔各十甘

草各二 右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分溫三服如人行四五里微利為度忌

海藻菰菜生菜麵蕎麥猪魚蒜

又療胸膈間伏氣不下食臍下滿柴胡湯方 柴胡 枳實 生薑 白朮各三甘草各二檳榔各十石

六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥

海藻菰菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十三首

病源疝者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散臍藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒疝腹

痛也十出第二卷中 廣濟療丈夫虛勞寒疝腹痛并主產後方 生乾地黄各三甘草各二茯苓 人參 當歸各二大棗各十四白

羊肉各脂 右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸藥煮取五升內葱白一把煮取四升

絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥忌葷羹海藻菰菜酢物餘無

忌出第四卷中

仲景傷寒論寒疝遶臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若脉沉弦者二物大烏頭煎主之方 大烏頭十五

林白蜜各二 石藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合

尚德按白要略作烏頭大者

尚德按今有方一十二首

五枝以水
三升煮取
一升去滓
內蜜二升
云云
尚德按要
略用下所
出五味桂
枝湯不用
桂汁
又按要略
甘草二兩
外臺蓋脫
兩字
尚德按要
升略用水八

一服不差明日更服日止一服不可再也忌猪肉冷水千金

又寒症腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛矣刺諸藥所不能治者抵當烏頭桂枝湯主之方

秋烏頭懷

枳殼白蜜一斤桂心四兩

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一

升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如

醉狀得吐者為中病也忌猪肉冷水生葱等花汪

又方桂心芍藥各三兩甘草二兩大棗十二枚右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和

前烏頭蜜令得一升餘並同前法服仲景傷寒論千金同

又療寒症腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸三兩生薑五兩肥羊肉一斤去脂

右三

味切以水一斗合煮取三升去滓溫服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而

嘔者加橘皮二兩木一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前經心錄

鹽

又療寒症腹中痛者柴胡桂枝湯方

柴胡四兩大棗六枚黃芩二兩人參各一兩甘草一兩半夏二合桂心生

薑芍藥各一兩

右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服又云人參湯作如桂枝法加半

夏柴胡黃芩復如柴胡湯法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉錫生蔥並出第十卷中

當歸生薑芍藥各三兩羊肉三斤

小品寒症氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味主之方

右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有效范汪同出第一卷

集驗療寒症氣來往衝心腹痛桂心湯方

桂心四兩生薑三兩吳茱萸二兩右三味切以酒一大升煎至三

合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生葱

又療寒症下牽少腹痛附子丸方

附子二兩桃仁二兩去皮尖

蒺藜子一升去角尖熱右三味搗篩末蜜和丸梧

小臺必

卷七

寒症腹痛方一十三首

二

又療積年腹內宿結症冷氣及諸癰癥等香豉丸方 香美爛豉暴乾微熬令香即止 小芥子去土石

微熬令赤即止略一 右二味搗篩蜜和丸梧子大空腹酒服二十九丸漸加至三十九日二服初服半

劑以來腹中微絞痛勿怪之是此藥攻病之候 又療症瘕冷氣方 採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日二服漸加至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒症胸脅支滿食飲不化寒中腹痛及嘔痢風瘕頸項強急不得俛仰方 桂心五茱萸更配白薇分乾薑加烏頭二分蜀椒五分芎藭四防葵二白芷二 右九味末之合蜜和為

丸如梧子先食服一九日三不知稍稍增之以腹中溫身中懷懷為度忌生菜猪肉冷水方中神無名子 范汪同出 第八卷中

寒症心痛方三首 病源夫症者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常處冷氣上衝於心故令

心痛也出第二 范汪大茱萸丸療心腹寒症胸中有逆氣時上搶心痛煩滿不得卧面目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食

而嘔變發寒熱方 吳茱萸半細辛 芍藥 柴胡前方用 旋復花 黃芩 紫苑 人參 白朮 茯苓 乾薑 桂心 附子炮甘草炙半夏洗當歸兩各半 右十六味搗篩以蜜和為丸如梧子先食服

三九日三不知稍加忌生蔥羊肉鰻酢物桃李雀肉豬肉生菜海藻菰菜除此更無所忌無桂心方有蜀椒 師有乾地黃無黃芩深 師同出第十四卷中

小品解急蜀椒湯主寒症氣心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出欲絕方 蜀椒二百枚附子一枚粳米半升乾

薑半升夏洗大棗二升甘草一兩 右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一升 數用療心腹痛困急欲死解結逐寒上下痛良忌豬羊肉鰻海藻菰菜同經心錄同出第一卷中

古今錄驗療心痛寒疝牡丹丸方 牡丹心桂心各二兩烏頭炮二枚 右三味末之合蜜和為丸如大豆旦

起未食服三九日二不知稍增之藥少急寧少服并治遁尸發動無烏頭附子亦可用炮之忌胡荽豬

肉冷水生葱等出第八卷中

辛疝方三首

集驗療卒疝暴痛方 灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上出第六卷中

文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方 擣沙參下篩酒服方寸匕立愈附從備急同

人若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張仲景飛尸走馬湯方 巴豆二枚去心皮杏仁

一枚去 右二味取綿纏撚令極碎投熱湯二合撿取白汁服之須臾差未差更一服老小量之通療

鬼擊有尸疹者常蓄此藥用驗忌野豬肉蘆笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也

腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癰疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而

痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰附疝也少腹與陰相引而痛大便難

名曰狼疝也凡七疝皆由氣血虛弱飲食寒溫不調之所生也出第二卷中

文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背脊名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅

痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出見若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不

時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之方臣等謹詳七疝已載前序 椒四分桔梗 芍藥 乾薑

厚朴吳細辛 附子炮各為頭一分 右八味末之蜜和丸服如大豆三九加至七八九日三服忌豬

肉冷水生菜出第一卷中 古今錄驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上支胸中滿少氣太醫丞樊之方 蜀椒五分乾薑 厚朴炙黃芩

尚穩按此
主治止六
疝疑脫一

細辛 芍藥 桂心絡四 桔梗仁烏 柴胡 茯苓 牡丹皮絡一 右十二味搗篩蜜和丸梧子

大先舖以酒服七九日三不知漸加以知為度忌豬肉冷水生蔥生菜酢物胡荽託王同出

集驗症氣桃仁湯方 桃仁去皮 吳茱萸 橘皮 海藻各三 生薑 茯苓 羌活 蒺藜子去角各

右八味切以水三大升煮取九合分為三服空心服忌酢物

寒症不能食方四首

深師療虛冷心腹寒症胸脇支滿飲食不消腹中痛久痢頸強芎藭丸方 芎藭分烏頭 防葵分三

椒分 白薇分 桂心分 白芷分 茺莢分 乾薑分 右九味搗篩蜜和丸如梧子飲服二九日三稍加至

五六丸以知為度忌豬肉冷水生蔥託王

又主虛冷痠痺症食不消心腹痛氣弱不欲食虛羸瘦吳茱萸丸方 吳茱萸分 紫苑 白薇絡三 烏

頭分 桂心分 前胡 芍藥 細辛 芎藭 黃芩各五 右十味下篩蜜和酒服如梧子五九日三

稍加之忌豬肉冷水桃李生蔥生菜等謹按別本有此方元欠五味按忌法有桃李即當用白

范汪療手足熱腹中寒症不能食飲數心腹痛十一物七熱飯後丸方 茯苓五 乾薑六 附子三 右藥乾薑

柴胡耐 芎藭耐 蜀椒耐 芒硝今減五合 杏仁一升去 葶藶子升加 桂心兩 附子三 右藥乾薑

茯苓不熱餘皆熱搗篩以蜜和丸如梧子飲服七九日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熱方

忌豬肉冷水醋物生蔥等出第十四卷中通按除乾薑茯苓當

集驗療寒症不能食方 取馬蘭子一升每日取胡桃許以麴拌熟煮吞之然後依常飯日再服服盡必

愈亦除腹內一切諸疾消食肥肌仍時燒埽熱以殺羊毛作氈裏却氈上慰之日一度尤佳

寒症積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於臍藏寒多則氣澀氣澀則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成也故無根本上下無所留止但諸藏腑

尚德樓
音缺與
良馬與
快通音
史疾也
注云所
反則本
馳疑當
馳通脉
數為脉
通為脉
審何據

受邪初未能為積聚邪氣留滯不去乃成積聚其為病也或左右脇下如覆杯或臍上下如臂或胃管閉

腹大如盤羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲食不為肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒

症積聚也其脉弦反所更而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死此第二十卷中通按脈數為聚脈遲為散

深師破積丸療寒症久積聚周走動搖大者如鼈小者如杯下來下去在於胃管大腸脹滿不通風寒則

腸鳴心下寒氣上搶胸脇支滿芫花丸方 芫花 蜀椒汗各一分 大黃 細辛各六分 桔梗各五分 烏頭四分 茱萸

芍藥 茯苓各三 龍膽仁半 夏一分 右十一味搗篩蜜和丸如梧子大飲服五丸日三當下如泥病

愈忌猪羊肉鰾酢物生菜等 又當歸丸療心腹勞強寒症邪氣往來堅固結聚苦寒煩悶下同 不得臥夜苦汗出大便堅小便不

利流飲在腹中食不生肌方 桔梗一分 葶藶子五分 蘇蘆一分 厚朴五分 杏仁五十枚 附子一分 桂心

人參 沙參各三 特生礬石半兩 右十味搗篩蜜和如梧子飲服三丸日三稍加之忌猪肉生菜

冷水出第十卷中 古今錄驗療久寒三十歲心腹症瘕瘕積聚邪氣往來厥逆搶心痛久瘕瘕瘦少氣婦人產乳餘疾胸脇

支滿不嗜食手足悁煩月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命丸方 食茱萸針 芍藥細辛 前

胡一云柴胡 乾薑 烏頭各十分 紫莖 黃芩 白朮 白薇各三分 芎藭 人參 乾地黄各五分 蜀椒汗

桂心各十分 右十五味搗篩蜜和為丸如梧子大先食服三丸日三不知稍加至七丸忌生菜葱豬

肉冷水桃李雀肉燕薹等註同出卷中 集驗療腎冷及疼症氣滯後灌方 鹽花一大 漿水升大 右二味和緩灌下部少間即下膿日一度再

灌之即止 心症方四首

病源心症者由陰氣積於內寒氣不散上衝於心故使心痛謂之心症也其痛也或如錐刀所刺或四肢

外臺祕要

卷七

心經方四首

十四

逆冷或唇口變青皆其候也

出第二
十卷中

范汪療心症復繞臍痛上支脅心下痛方 芍藥 桔梗 細辛 蜀椒 桂心 乾薑各三附子一分

右七味末之合蜜和為丸如梧子服七丸以酒下日二服忌豬肉冷水生葱生菜等

又療三十年心症神方 真射干藏好 新好茱萸一握 右二味等分搗篩蜜和丸服如麻子二九日三

藥勢盡乃熱食良已用得差

劉國英
所撰


又主心症方 灸兩足大指甲寅之際甲寅各半炷隨年壯良

通按寅
當作寅

又心症發時心腹痛欲死方 灸足心及足大指甲後橫理節上及大指歧間白黑肉際百壯則止足心

者在足下偏近大指本節際不當足心中央也

並出第十八卷中
通按足心在
足下近大指本節即湧泉穴也



67
W24 T W
1915
V. 5-7